



# Lovtidende A

2020

Udgivet den 28. november 2020

24. november 2020.

Nr. 1710.

## Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.2

### § 1

I bekendtgørelse nr. 1231 af 25. november 2019 om Danske Lægemiddelstandarder 2020.2, som ændret ved bekendtgørelse nr. 129 af 17. februar 2020 og bekendtgørelse nr. 736 af 26. maj 2020, foretages følgende ændringer:

1. I bekendtgørelsens *titel* ændres »2020.2« til: »2020.3«.

2. I § 1 ændres »2020.2« til: »2020.3«.

3. *Bilag 1* affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. *Bilag 2* affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

5. *Bilag 3* affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

### § 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

*Lægemiddelstyrelsen, den 24. november 2020*

THOMAS SENDEROVITZ

/ Merete Hermann

**Bilag 1****»Bilag 1****Den gældende Europæiske Farmakopé, jf. § 1 a**

I overensstemmelse med artikel 1, litra b, i europæisk konvention af 22. juli 1964 om udarbejdelse af en europæisk farmakope og denne bekendtgørelses § 1 a, består den gældende Europæiske Farmakopé, der finder anvendelse i Danmark, af:

- Den 10. udgave af den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed.), der trådte i kraft den 1. januar 2020.
- Tillægsbind 10.1 til den 10. udgave af den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed. Suppl. 10.1), der trådte i kraft den 1. april 2020.
- Tillægsbind 10.2 til den 10. udgave af den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed. Suppl. 10.2), der trådte i kraft den 1. juli 2020.
- Tillægsbind 10.3 til den 10. udgave af den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed. Suppl. 10.3), der træder i kraft den 1. januar 2021.«

**Bilag 2****»Bilag 2**

## Ændringer i European Pharmacopoeia 10.3

## Nyoptaget

## Råvarer

| <i>Følgende råvaremonografier er optaget med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Engelsk</b>                                                                             | <b>Dansk</b>                                   |
| Amprolium hydrochloride for veterinary use (3010)                                          | Amproliumhydrochlorid til veterinær anvendelse |
| Betiatide for radiopharmaceutical preparations (2551)                                      | Betiatid til radiofarmaceutisk fremstilling    |
| Cyathula root (2998)                                                                       | <i>Intet dansk navn</i>                        |
| Deferasirox (2933)                                                                         | Deferasirox                                    |
| DL-Lysine acetylsalicylate (2812)                                                          | Lysinacetylsalicylat, DL-,                     |
| Ganoderma (3001)                                                                           | Skinnende lakporesvamp                         |
| Latanoprost (2230)                                                                         | Latanoprost                                    |
| Rivaroxaban (2932)                                                                         | Rivaroxaban                                    |
| Trifluridine (2910)                                                                        | Trifluridin                                    |

## Færdigvarer

| <i>Følgende færdigvaremonografier er optaget med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Engelsk</b>                                                                                 | <b>Dansk</b>                                                                                 |
| Dronedarone tablets (3038)                                                                     | Dronedarontabletter                                                                          |
| Gallium [ <sup>68</sup> Ga] chloride (accelerator-produced) solution for radiolabelling (3109) | Galliumchlorid [ <sup>68</sup> Ga] (acceleratorproduceret) opløsning til radioaktiv mærkning |

## Udgået

## Råvarer

| <i>Følgende råvaremonografier er udgået med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Engelsk</b>                                                                            | <b>Dansk</b>    |
| Carisoprodol (1689)                                                                       | Carisoprodol    |
| Insulin, bovine (1637)                                                                    | Insulin, bovint |
| Meprobamate (0407)                                                                        | Meprobamat      |
| Nalidixic acid (0701)                                                                     | Nalidixinsyre   |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Senna pods, Tinnevelly (0208) | Sennesbælg, Tinnevelly |
|-------------------------------|------------------------|

## Færdigvarer

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Ingen færdigvaremonografier er udgået med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |              |
| <b>Engelsk</b>                                                                             | <b>Dansk</b> |
|                                                                                            |              |

## Revideret/korrigeret

## Råvarer

|                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>Følgende råvaremonografier er ændrede (revised + corrected) i Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |  |
| <b>Engelsk</b>                                                                                                 |  |
| Acamprosate calcium (1585)                                                                                     |  |
| Acetylcysteine (0967)                                                                                          |  |
| Adrenaline (2303)                                                                                              |  |
| Alfentanil hydrochloride hydrate (1062)                                                                        |  |
| Amphotericin B (1292)                                                                                          |  |
| Ascorbyl palmitate (0807)                                                                                      |  |
| Azathioprine (0369)                                                                                            |  |
| Bacitracin zinc (0466)                                                                                         |  |
| Bambuterol hydrochloride (1293)                                                                                |  |
| Belamcanda chinensis rhizome (2561)                                                                            |  |
| Betamethasone (0312)                                                                                           |  |
| Betamethasone acetate (0975)                                                                                   |  |
| Betamethasone dipropionate (0809)                                                                              |  |
| Bleomycin sulfate (0976)                                                                                       |  |
| Borax (0013)                                                                                                   |  |
| Calcium carbonate (0014)                                                                                       |  |
| Calcium chloride dihydrate (0015)                                                                              |  |
| Calcium sulfate dihydrate (0982)                                                                               |  |
| Caraway fruit (1080)                                                                                           |  |
| Celiprolol hydrochloride (1632)                                                                                |  |
| Cetostearyl alcohol (0702)                                                                                     |  |
| Chinese goldthread rhizome (2715)                                                                              |  |
| Clove (0376)                                                                                                   |  |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Codeine monohydrate (0076)                     |
| Codeine phosphate hemihydrate (0074)           |
| Cod-liver oil, farmed (2398)                   |
| Colistimethate sodium (0319)                   |
| Colistin sulfate (0320)                        |
| Copovidone (0891)                              |
| Cyanocobalamin (0547)                          |
| Cyclizine hydrochloride (1092)                 |
| Danaparoid sodium (2090)                       |
| Dexamethasone (0388)                           |
| Dexamethasone acetate (0548)                   |
| Dimethyl sulfoxide (0763)                      |
| Dipotassium phosphate (1003)                   |
| Disodium phosphate (1509)                      |
| Disodium phosphate dihydrate (0602)            |
| Disodium phosphate dodecahydrate (0118)        |
| Epinastine hydrochloride (2411)                |
| Epirubicin hydrochloride (1590)                |
| Ergometrine maleate (0223)                     |
| Ergotamine tartrate (0224)                     |
| Etanercept (2895)                              |
| Everolimus (2918)                              |
| Fingolimod hydrochloride (2988)                |
| Fluoxetine hydrochloride (1104)                |
| Fluphenazine enantate (1015)                   |
| Galantamine hydrobromide (2366)                |
| Gentamicin sulfate (0331)                      |
| Glycine (0614)                                 |
| Hawthorn leaf and flower (1432)                |
| Hawthorn leaf and flower dry extract (1865)    |
| Hawthorn leaf and flower liquid extract (1864) |
| Indapamide (1108)                              |
| Isoconazole (1018)                             |
| Isoconazole nitrate (1017)                     |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Josamycin (1983)                           |
| Josamycin propionate (1982)                |
| Ketoconazole (0921)                        |
| Labetalol hydrochloride (0923)             |
| Lactitol monohydrate (1337)                |
| Lactose (1061)                             |
| Lactose monohydrate (0187)                 |
| Letrozole (2334)                           |
| Levocabastine hydrochloride (1484)         |
| Lime flower (0957)                         |
| Lovage root (1233)                         |
| Magnesium chloride hexahydrate (0402)      |
| Magnesium hydroxide (0039)                 |
| Magnesium oxide, heavy (0041)              |
| Magnesium oxide, light (0040)              |
| Magnesium sulfate heptahydrate (0044)      |
| Mexiletine hydrochloride (1029)            |
| Minocycline hydrochloride dihydrate (1030) |
| Moxifloxacin hydrochloride (2254)          |
| Mupirocin (1450)                           |
| Mupirocin calcium (1451)                   |
| Mycophenolate sodium (2813)                |
| Neomycin sulfate (0197)                    |
| Nevirapine hemihydrate (2479)              |
| Ofloxacin (1455)                           |
| Omega-3-acid triglycerides (1352)          |
| Opium dry extract, standardised (1839)     |
| Paclitaxel (1794)                          |
| Passionflower herb (1459)                  |
| Passionflower herb dry extract (1882)      |
| Pentobarbital (0200)                       |
| Pentobarbital sodium (0419)                |
| Phenylephrine (1035)                       |
| Phenylephrine hydrochloride (0632)         |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Pillules for homoeopathic preparations (2153)       |
| Pimobendan for veterinary use (2179)                |
| Polymyxin B sulfate (0203)                          |
| Potassium chloride (0185)                           |
| Potassium clavulanate (1140)                        |
| Potassium clavulanate, diluted (1653)               |
| Prednisolone acetate (0734)                         |
| Prednisone (0354)                                   |
| Primidone (0584)                                    |
| Raltegravir potassium (2887)                        |
| Rifamycin sodium (0432)                             |
| Rivastigmine (2629)                                 |
| Salmon oil, farmed (1910)                           |
| Silver, colloidal (2281)                            |
| Sodium acetate trihydrate (0411)                    |
| Sodium carbonate (0773)                             |
| Sodium carbonate decahydrate (0191)                 |
| Sodium carbonate monohydrate (0192)                 |
| Sodium dihydrogen phosphate dihydrate (0194)        |
| Sodium hydrogen carbonate (0195)                    |
| Sodium laurilsulfate (0098)                         |
| Sodium metabisulfite (0849)                         |
| Sotalol hydrochloride (2004)                        |
| Spiramycin (0293)                                   |
| Stanozolol (1568)                                   |
| Streptomycin sulfate (0053)                         |
| Sulfobutylbetadex sodium (2804)                     |
| Sulfur (0953)                                       |
| Sulfuric acid (1572)                                |
| Tilidine hydrochloride hemihydrate (1767)           |
| Tramadol hydrochloride (1681)                       |
| Tramazoline hydrochloride monohydrate (1597)        |
| Vitamin A concentrate (oily form), synthetic (0219) |
| Wheat starch (0359)                                 |

|                       |
|-----------------------|
| Wool alcohols (0593)  |
| Zinc acexamate (1279) |

## Færdigvarer

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Følgende færdigvaremonografier er ændrede (revised + corrected) i Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i>                                                |
| <b>Engelsk</b>                                                                                                                                                    |
| Deferiprone oral solution (2987)                                                                                                                                  |
| Deferiprone tablets (2986)                                                                                                                                        |
| Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed) (0444)                                                                                                                  |
| Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content) (0647)                                                                                      |
| Diphtheria, tetanus and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed) (2062)                                                                                              |
| Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed) (1931)                                                                                |
| Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content) (2764)                                                    |
| Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine (adsorbed) (0445)                                                                                          |
| Diphtheria, tetanus and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content) (2328)                                                         |
| Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed) (1932)                                                  |
| Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed) (1933)                                                            |
| Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) (1934)                                                   |
| Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content) (2329)                       |
| Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed) (2067) |
| Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed) (2065)                     |
| Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) (2061)                                                             |
| Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed) (2066)                               |
| Human coagulation factor IX (rDNA) concentrated solution (2522)                                                                                                   |
| Human coagulation factor IX (rDNA) powder for solution for injection (2994)                                                                                       |
| Infliximab concentrated solution (2928)                                                                                                                           |
| Lacosamide infusion (2991)                                                                                                                                        |
| Lacosamide oral solution (2990)                                                                                                                                   |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Lacosamide tablets (2989)                 |
| Raltegravir chewable tablets (2939)       |
| Raltegravir tablets (2938)                |
| Rosuvastatin tablets (3008)               |
| Sitagliptin tablets (2927)                |
| Solutions for organ preservation (1264)   |
| Tetanus vaccine (adsorbed) (0452)         |
| Tetanus vaccine for veterinary use (0697) |

## Titelændring

## Råvarer

| <i>Følgende råvaremonografier har ændret titel med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |                                                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nuværende</b>                                                                                 | <b>Tidligere</b>                                    | <b>Nuværende dansk titel</b>                |
| Hawthorn leaf and flower liquid extract (1864)                                                   | Hawthorn leaf and flower liquid extract, quantified | Hvidtjørn blad og blomst, flydende ekstrakt |
| Passionflower herb (1459)                                                                        | Passion flower                                      | Passionsblomsturt                           |
| Passionflower herb dry extract (1882)                                                            | Passion flower dry extract                          | Passionsblomsturt tørreksrakt               |
| Silver, colloidal (2281)                                                                         | Silver, colloidal, for external use                 | Sølv, kolloid                               |
| Sulfur (0953)                                                                                    | Sulfur for external use                             | Svovl                                       |

## Færdigvarer

| <i>Ingen færdigvaremonografier har ændret titel med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |                  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Nuværende</b>                                                                                  | <b>Tidligere</b> | <b>Nuværende dansk titel</b> |
|                                                                                                   |                  |                              |

## Generelle kapitler og monografier

## Nyoptagne generelle kapitler

| <i>Følgende nye generelle kapitler er optaget med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.32.                                                                                         | Test for bacterial endotoxins using recombinant factor C                   |
| 5.1.12.                                                                                         | Depyrogenation of items used in the production of parenteral preparations  |
| 5.17.2.                                                                                         | Recommendations on testing of particulate contamination: visible particles |

## Nyoptagne generelle monografier

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ingen nye generelle monografier er optaget med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |
|                                                                                                 |

### Ændrede generelle kapitler

| <i>Følgende generelle kapitler er ændret (revised + corrected) med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.2.                                                                                                           | Degree of coloration of liquids                                                                                         |
| 2.2.24.                                                                                                          | Absorption spectrophotometry, infrared                                                                                  |
| 2.2.29.                                                                                                          | Liquid chromatography                                                                                                   |
| 2.2.38.                                                                                                          | Conductivity                                                                                                            |
| 2.2.39.                                                                                                          | Molecular mass distribution in dextrans                                                                                 |
| 2.2.49.                                                                                                          | Falling ball and automatic rolling ball viscometer methods                                                              |
| 2.6.12.                                                                                                          | Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration tests                                        |
| 2.6.13.                                                                                                          | Microbiological examination of non-sterile products: test for specified micro-organisms                                 |
| 2.6.27.                                                                                                          | Microbiological examination of cell-based preparations                                                                  |
| 2.6.37.                                                                                                          | Principles for the detection of extraneous viruses in immunological veterinary medicinal products using culture methods |
| 2.7.14.                                                                                                          | Assay of hepatitis A vaccine                                                                                            |
| 2.9.19.                                                                                                          | Particulate contamination: sub-visible particles                                                                        |
| 3.3.4.                                                                                                           | Sterile plastic containers for human blood and blood components                                                         |
| 3.3.8.                                                                                                           | Sterile single-use plastic syringes                                                                                     |
| 4.                                                                                                               | Reagents                                                                                                                |
| 5.1.4.                                                                                                           | Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use                |
| 5.1.5.                                                                                                           | Application of the F concepts to heat sterilisation processes                                                           |
| 5.1.10.                                                                                                          | Guidelines for using the test for bacterial endotoxins                                                                  |
| 5.22.                                                                                                            | Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine                                                              |

### Ændrede generelle monografier

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Følgende generelle monografier er ændrede (revised + corrected) med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |
| Substances for pharmaceutical use (2034)                                                                             |

### Ændrede generelle tekster

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Følgende generelle tekster er ændrede (revised + corrected) med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |
| Homoeopathic preparations (1038)                                                                                 |

### Ændrede lægemiddelformer (Dosage forms)

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Følgende lægemiddelformer er ændrede (revised + corrected) med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |
| Nasal preparations (0676)                                                                                       |
| Oromucosal preparations (1807)                                                                                  |

### Kapitler med ændret titel

| <i>Følgende kapitler har ændret navn med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuværende                                                                              | Tidligere                                                                                |
| 5.1.5. Application of the F concepts to heat sterilisation processes                   | Application of the F <sub>0</sub> concept to steam sterilisation of aqueous preparations |

### Kapitler med ændret nummer

| <i>Ingen kapitler har ændret nummer med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Nuværende                                                                             | Tidligere | Navn |
|                                                                                       |           |      |

### Harmoniserede kapitler og monografier (med USP og JP)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ingen monografier er blevet harmoniseret med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i> |
|                                                                                               |

### Slettede kapitler

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Følgende kapitler er blevet slettet med Ph. Eur. 10<sup>th</sup> Ed., Suppl. 10.3</i>      |
| 2.6.24. Avian viral vaccines: tests for extraneous agents in seed lots                        |
| 2.6.25. Avian live virus vaccines: tests for extraneous agents in batches of finished product |

**Bilag 3****»Bilag 3****Lægemidlers kvalitet****Indeholder:****Lægemidlers kvalitet****Fremstilling af lægemidler – Råvarer****Fremstilling af lægemidler – Lægemidler****Kontrol af lægemidler****Opbevaring af lægemidler****Magistrelle lægemidler****Fremstilling af magistrelle lægemidler****Tillæg til lægemiddelformstandarder****Kontrol af magistrelle lægemidler****Opbevaring af magistrelle lægemidler**

**Lægemidler til beredskabssituationer, det militære forsvar, det statslige redningsberedskab eller  
øvrige beredskabsmyndigheder.**

**Dansk monografi Cannabisblomst****Produktformer for medicinsk cannabis****Lægemidlers kvalitet**

Fremstilling, kontrol og opbevaring af lægemidler skal finde sted i overensstemmelse med de krav, der er angivet i nærværende kapitel samt de krav, der måtte være anført i de tilhørende lægemiddelformstandarder.

**Fremstilling af lægemidler – Råvarer***Generelle monografier*

Alle råvarer, der indgår i lægemidler og er beskrevet i Den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur.), skal overholde kravene i de relevante generelle monografier.

*Råvarekvalitet*

Råvarer, som anvendes til lægemidler, skal opfylde kravene i den generelle monografi, Substances for pharmaceutical use (2034) i Ph. Eur.. Denne indeholder overordnede krav til testning og specifikationsgrænser for alle råvarer og hjælpestoffer i farmakopéen.

Når det fremgår af en standard for en råvare i Ph. Eur. eller i DLS, at der stilles specielle krav til renhed af råvaren ved anvendelse til bestemte lægemiddelformer, skal en sådan råvare anvendes til fremstilling af lægemidler tilhørende disse lægemiddelformer.

*Restsolventer i råvarer*

Råvarer, der indgår i lægemidler til human anvendelse, skal opfylde CPMP / ICH guideline Impurities: Residual solvents (EMA/CHMP/ICH/82260/2006), gengivet i Ph. Eur. kapitel 5.4 »Residual solvents«, vedrørende indhold af restsolventer.

Der henvises i øvrigt til teksten under afsnittet »Restsolventer i lægemidler« i denne sektion.

*Spongiforme encephalopatiagenser fra dyr*

Råvarer, der helt eller delvist er af animalsk oprindelse, hvor der er mulighed for overførsel af spongiforme encephalopatiagenser (TSE) fra dyr, skal opfylde kvalitetskravene i det generelle afsnit Ph. Eur. kapitel 5.2.8 »Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy via human and veterinary medicinal products«, samt kvalitetskravene i den generelle monografi »Products with risk of transmitting agents of animal spongiform encephalopathy«.

Der henvises i øvrigt til teksten under afsnittet »Lægemidler« i dette kapitel.

*Lægemiddelstof*

Lægemiddelstoffer, der anvendes til fremstilling af humane og veterinære lægemidler, skal fremstilles i henhold til gældende GMP regler for råvarer.

Ved fremstilling af et lægemiddel skal det tilstræbes, at det får et indhold af lægemiddelstof, der er i overensstemmelse med lægemidlets deklaration. Såfremt lægemiddelstoffet består af en råvare, hvor det kvantitative indhold kan variere betydeligt, skal der ved fremstillingen tages højde for resultatet, der er opnået ved den kvantitative bestemmelse af den aktuelt anvendte batch af råvaren.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droger              | <p>Råvarer, der er af plante-, animalsk eller mineralsk materiale, og som foreligger i ubehandlet form, betegnes droger. Droger kan anvendes til fremstilling af drogetilberedninger eller uden yderligere forarbejdning som råvarer i lægemidler.</p> <p>Droger, der er hele, fragmenterede, knækkede eller skårne planter, plantedele, alger, svampe eller mosser i ubehandlet form og foreligger i tørret form eller eventuelt i frisk form, skal opfylde kravene i den generelle monografi »Herbal drugs« (no 1433) i Ph. Eur.</p>                |
| Drogetilberedninger | <p>Råvarer, som er homogene produkter og fremstillet ved at behandle droger ved f.eks. findeling (snitning eller pulverisering), ekstraktion, destillation, presning, fraktionering, oprensning, opkoncentrering og/eller fermentering, betegnes drogetilberedninger.</p> <p>Drogetilberedninger af plantemateriale (herbal drugs) skal opfylde kravene i den generelle monografi »Herbal drug preparations« (no 1434) i Ph. Eur.</p>                                                                                                                 |
| Ekstrakter          | <p>Råvarer, som er drogeudtræk, dvs. fremstillet ved ekstraktion af droger med ekstraktionsmidler og sædvanligvis opkoncentreret til en vis konsistens og eventuelt indstillet til en foreskrevet styrke, betegnes ekstrakter. Ekstrakter er drogetilberedninger og kan være flydende (flydende ekstrakter og tinkturer), halvfaste (bløde ekstrakter og oleoresiner) eller faste (tørekstrakter).</p> <p>Ekstrakter af plantemateriale (herbal drugs) skal opfylde kravene i den generelle monografi »Herbal drug extracts« (no 0765) i Ph. Eur.</p> |
| Urteteer            | <p>Råvarer, som udelukkende består af en eller flere droger af plantemateriale, og som er beregnet til fremstilling af vandige, orale tilberedninger, betegnes urteteer. Urteteer er drogetilberedninger, som skal opfylde kravene i den generelle monografi »Herbal teas« (no 1435) i Ph. Eur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

- Vegetabilske fede olier** Råvarer, som primært består af faste eller flydende triglycerider af fedtsyrer, betegnes vegetabilske fede olier. Vegetabilske fede olier fremstilles ved presning og/eller udtrækning fra frø eller frugtkerner/-sten, evt. efterfulgt af raffinering og hydrogenering. Vegetabilske fede olier skal opfylde kravene i den generelle monografi »Vegetable fatty oils« (no. 1579) i Ph. Eur.
- Æteriske olier** Råvarer, som er flygtige og duftende, og som oftest består af komplekse blandinger af stoffer, betegnes æteriske olier. Æteriske olier fremstilles ved destillation eller en mekanisk forarbejdning af plantemateriale. Æteriske olier skal opfylde kravene i den generelle monografi »Essential oils« (no. 2098) i Ph. Eur.
- Droger til homøopatiske lægemidler** Råvarer, der er af plante-, animalsk eller mineralsk materiale, som foreligger i ubehandlet form, og som anvendes i homøopatiske lægemidler, betegnes droger til homøopatiske lægemidler.  
Droger til homøopatiske lægemidler, der er hele, fragmenterede, knækkede eller skårne planter, plantedele, alger, svampe eller mosser i ubehandlet form og foreligger i frisk eller tørret form, skal overholde kravene i den generelle monografi »Herbal drugs for homoeopathic preparations« (no. 2045) i Ph. Eur.
- Urtinkture til homøopatiske lægemidler** Råvarer, som er flydende ekstrakter af droger til homøopatiske lægemidler eller er plantesaft fra sådanne droger, betegnes urtinkture til homøopatiske lægemidler.  
Urtinkture til homøopatiske lægemidler skal opfylde kravene i den generelle monografi »Mother tinctures for homoeopathic preparations« (no. 2029) i Ph. Eur.

### Hjælpestoffer

- Vand til fortynding af hæmodialysekoncentrater.** Til fortynding af hæmodialysekoncentrater skal anvendes vand af en kvalitet som er angivet i monografien »Haemodialysis solutions, concentrated, water for diluting« (no. 1167) i Ph. Eur.
- Farvestoffer** Lægemidler må, jf. EF-direktivet 2009/35/EC og forordning nr. 1333/2008 med senere tilføjelser, farves med de farvestoffer, der er optaget i nedenstående fortegnelse over godkendte farvestoffer.  
Farvestofferne riboflavin (E 101 (i)), riboflavin-natriumphosphat (E 101 (ii)), aktivt kul (E 153), betacaroten (E 160a (i)), calciumcarbonat (E 170) og titandioxid (E 171) skal opfylde de kvalitetskrav, der fremgår af de i DLS bekendtgjorte råvarestandarder (Ph. Eur.). De øvrige farvestoffer skal opfylde de krav til identitet og renhed, der fremgår af forordning nr. 231/2012 med senere tilføjelser.

Fortegnelse over godkendte farvestoffer i lægemidler:

| E-nummer | Navn |
|----------|------|
|          |      |

|        |                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 100  | Curcumin                                                                                                                                 |
| E 101  | (i) Riboflavin<br>(ii) Riboflavin-5'-phosphat (Ph. Eur. navn: Riboflavinnatriumphosphat)                                                 |
| E 102  | Tartrazin                                                                                                                                |
| E 104  | Quinolingult                                                                                                                             |
| E 110  | Sunset yellow FCF (Orange Yellow S)                                                                                                      |
| E 120  | Carminer (carminsyre, cochenille)                                                                                                        |
| E 122  | Azorubin (carmoisin)                                                                                                                     |
| E 123  | Amaranth                                                                                                                                 |
| E 124  | Ponceau 4R (cochenillerød A)                                                                                                             |
| E 127  | Erythrosin                                                                                                                               |
| E 129  | Allura Red AC                                                                                                                            |
| E 131  | Patent Blue V                                                                                                                            |
| E 132  | Indigotin (indigocarmin)                                                                                                                 |
| E 133  | Brilliant Blue FCF                                                                                                                       |
| E 140  | Chlorophyll og chlorophylliner                                                                                                           |
| E 141  | Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks                                                                             |
| E 142  | Green S                                                                                                                                  |
| E 150a | Karamel                                                                                                                                  |
| E 150b | Kaustisk sulfiteret karamel                                                                                                              |
| E 150c | Ammonieret karamel                                                                                                                       |
| E 150d | Ammonieret sulfiteret karamel                                                                                                            |
| E 151  | Brilliant Black PN                                                                                                                       |
| E 153  | Vegetabilsk kul (Ph. Eur. navn: Aktivt kul)                                                                                              |
| E 155  | Brown HT                                                                                                                                 |
| E 160a | Blandede carotener<br>(i) Beta-caroten<br>(ii) Plantecarotener<br>(iii) Beta-caroten fra <i>Blakeslea trispora</i><br>(iv) Algecarotener |
| E 160b | Annattoekstrakter (bixin, norbixin)                                                                                                      |
| E 160c | Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)                                                                                                 |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| E 160d | Lycopen                          |
| E 160e | Beta-apo-8'-carotenal (C 30)     |
| E 161b | Lutein                           |
| E 161g | Canthaxanthin                    |
| E 162  | Rødbedefarve (betaniner)         |
| E 163  | Anthocyaniner                    |
| E 170  | Calciumcarbonat                  |
| E 171  | Titandioxid                      |
| E 172  | Jernoxider og jernhydroxider     |
| E 173  | Aluminium                        |
| E 174  | Sølv                             |
| E 175  | Guld                             |
| E 180  | Rubinpigment BK (litholrubin BK) |

**Konserveringsstoffer**      Konservering af lægemidler kan ske under anvendelse af konserveringsstoffer, for hvilke der er bekendtgjort en standard i DLS, eller som er optaget i EU-listen i bilag II til forordning nr. 1333/2008 med senere tilføjelser. Det skal i det enkelte tilfælde sikres, at den benyttede art og koncentration af konserveringsstof udøver en tilstrækkelig konserverende effekt i henhold til Ph. Eur. 5.1.3. »Efficacy of antimicrobial preservation«.

**Aromastoffer**      Til smagskorrigerende og aromatisering af lægemidler skal de begrænsninger, der er anført i »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevaringredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer...» med senere tilføjelser, finde anvendelse, jf. endvidere bilag 6 i DLS.

*Beholdere, lukker mv.*

(Se desuden Beholdere, lukker mv. i bilag 4).

**Glasbeholdere**      Glasbeholdere, beregnet til lægemidler til parenteralt brug skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.1. »Glass containers for pharmaceutical use« angivne kvalitetskrav.  
 Glasbeholdere, der som led i fremstillingen benyttes til varmebehandling af øjenbadevand, vandige øjendråber og øredråber, skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.1. »Glass container for pharmaceutical use« angivne kvalitetskrav for glas af type I.  
 Glasbeholdere beregnet til lægemidler bestående af vandige opløsninger til anden anvendelse skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.1. »Glass container for pharmaceutical use« angivne kvalitetskrav for glas af type III.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plastbeholdere                            | <p>Plastbeholdere og lukkere af plast skal fremstilles og kontrolleres i henhold til de i Ph. Eur. 3.2.2. »Plastic containers and closures for pharmaceutical use« angivne retningslinjer.</p> <p>Plastbeholdere til vandige opløsninger til infusion skal opfylde de i Ph. Eur. 3.2.2.1. »Plastic containers for aqueous solutions for infusion« angivne kvalitetskrav.</p> <p>Plastmaterialer af polyolefiner beregnet til fremstilling af beholdere til lægemidler skal - med mindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.3. »Polyolefines« angivne kvalitetskrav. For faste, doserede lægemidler vil retningslinjerne for dokumentation angivet i EU guidelinen »Plastic Immediate Packaging Materials« kunne følges i stedet for opfyldelse af polyolefin-standarden. Det skal dokumenteres at plastmaterialet er godkendt til brug til lægemidler og/eller fødevarer, f.eks. ved reference til EU kommissionens forordning 10/2011 af 14. januar 2011, eller godkendelser fra Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Tyskland.</p> <p>Plastmaterialer af polyethylen uden additiver, polyethylen med additiver og polypropylen beregnet til fremstilling af beholdere til præparater til parenteralt brug og øjenpræparater skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i henholdsvis Ph. Eur. kapitel 3.1.4., 3.1.5. og 3.1.6. angivne kvalitetskrav.</p> <p>Plastmaterialer af polyethylenvinylacetat copolymer beregnet til fremstilling af beholdere til præparater til total parenteral ernæring skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.7. angivne kvalitetskrav.</p> <p>Plastmaterialer af ikke-blødgjort polyvinylchlorid beregnet til fremstilling af beholdere til vandige præparater, der ikke skal injiceres, skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.10. angivne kvalitetskrav.</p> <p>Plastmaterialer af ikke-blødgjort polyvinylchlorid beregnet til fremstilling af beholdere til tørre præparater til oral anvendelse skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.11. angivne kvalitetskrav.</p> <p>Plastmaterialer af blødgjort polyvinylchlorid beregnet til fremstilling af beholdere til vandige opløsninger til infusion skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.14. angivne kvalitetskrav.</p> <p>Plastmaterialer af polyethylenterephthalat beregnet til fremstilling af beholdere til præparater der ikke skal anvendes parenteralt - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.15. angivne kvalitetskrav.</p> |
| Plastbeholdere til blod og blodfraktioner | <p>Plastbeholdere til blod og blodfraktioner skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.3.4 »Sterile plastic containers for human blood and blood components« angivne kvalitetskrav.</p> <p>Plastbeholdere af blødgjort polyvinylchlorid beregnet til blod og blodfraktioner skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.3.5 eller 3.3.6 angivne kvalitetskrav. Plastmaterialer af blødgjort polyvinylchlorid beregnet til fremstilling af beholdere til blod og blodfraktioner skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. kapitel 3.3.2 angivne kvalitetskrav.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siliconeolier                             | <p>Siliconeolier, der anvendes som smøremidler, skal opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.8. (no. 30108) »Silicone oil used as a lubricant« angivne kvalitetskrav.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siliconelukker     | Siliconeelastomerer, der anvendes til lukkemidler, skal opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.9. (no. 30109) »Silicone elastomer for closures and tubing« angivne kvalitetskrav.                                                                                                     |
| Gummilukker        | Gummilukker til vandige præparater til parenteralt brug skal opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.9. (no. 30209) »Rubber closures for containers for aqueous parenteral preparations, for powders and for freeze-dried powders« angivne kvalitetskrav, med mindre andet er fastsat. |
| Aerosolbeholdere   | Beholdere, beregnet til at indeholde lægemidler under tryk, skal opfylde de angivne kvalitetskrav i lægemiddelformmonografien »Pressurised Pharmaceutical Preparations« (no. 0523) i Ph. Eur.                                                                                    |
| Forfyldte sprøjter | Sprøjter, beregnet til at indeholde lægemidler som forfyldte sprøjter, skal opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.3.8 »Sterile single use plastic syringes« (no. 30208) angivne kvalitetskrav.                                                                                         |

### **Fremstilling af lægemidler – Lægemidler**

Alle lægemidler skal overholde kravene i de relevante generelle monografier i Den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur.).

#### *Ikke-sterile lægemidler*

Ikke-sterile lægemidler skal fremstilles under tilfredsstillende hygiejniske forhold, og de indgående råvarer skal være af tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet.

Lægemidler skal overholde de krav til mikrobiel renhed, som angives i Ph. Eur. kapitel 5.1.4 »Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use«. Plantelægemidler til oral anvendelse skal dog overholde kravene i Ph. Eur. kapitel 5.1.8 »Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparation«

Det er ikke tilladt ved fremstilling af lægemidler at benytte lægemiddelstoffer eller hjælpestoffer af vegetabilsk oprindelse, som har været behandlet med ethylenoxid.

Når det fremgår af en standard for en råvare i den Europæiske Farmakopé, at nationale myndigheder kan stille krav vedrørende et højest tilladt antal af mikroorganismer eller fravær af specifikke mikroorganismer, udgør de pågældende krav en del af den i DLS bekendtgjorte standard for råvaren.

#### *Sterile og aseptisk fremstillede lægemidler*

Sterile og aseptisk fremstillede lægemidler skal fremstilles og steriliseres i henhold til de i Ph. Eur. kapitel 5.1.1. »Methods of preparation of sterile products« angivne retningslinjer.

#### *Parenterale lægemidler*

Parenterale lægemidler skal opfylde kravene beskrevet i afsnittet »Parenteral preparations« (no. 0520) i Ph. Eur.

#### *Endotoxinfrie og pyrogenfrie lægemidler*

Når det af lægemiddelformstandarden fremgår, at præparatet skal opfylde prøven for bakterielle endotoksiner eller prøven for pyrogener, skal der til fremstillingen så vidt muligt anvendes råvarer der overholder en prøve for endotoksiner som beskrevet i »Bacterial endotoxins« Ph. Eur. 2.6.14. eller prøven for pyrogener beskrevet i »Pyrogens« Ph. Eur. 2.6.8. For en råvare, for hvilken det af en standard i den Europæiske

Farmakopé fremgår, at nationale myndigheder kan kræve, at »Bacterial endotoxins« Ph. Eur. 2.6.14. eller »Pyrogens« Ph. Eur. 2.6.8., er opfyldt, udgør denne prøve en del af den i DLS bekendtgjorte standard, og råvaren skal mærkes i overensstemmelse hermed.

I overensstemmelse med bestemmelserne i den Europæiske konvention om beskyttelse af forsøgsdyr skal tests udføres på en sådan måde, at der anvendes det mindste antal dyr, og at forsøgene forårsager mindst mulig smerte og lidelse (angst eller varigt men). Hvor det er muligt og efter en produktspecifik validering, skal pyrogentesten som udgangspunkt erstattes af Ph. Eur. 's Monocyte-activation test – (MAT-test), kapitel 2.6.30.

#### *Spongiforme encephalopatiagenser fra dyr*

Et lægemiddel, der helt eller delvist består af råvarer af animalsk oprindelse, hvor der er mulighed for overførsel af spongiforme encephalopatiagenser (TSE) fra dyr, skal opfylde kvalitetskravene i det generelle afsnit i Ph. Eur. 5.2.8. »Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products«, samt kvalitetskravene i den generelle monografi »Products with risk of transmitting agents of animal spongiform encephalopathies«.

Ansøgeren/indehaveren af en markedsføringstilladelse skal dokumentere, at lægemidlet fremstilles i overensstemmelse med ovenstående krav om minimering af risikoen for overførsel af spongiforme encephalopatiagenser fra dyr via lægemidler. Dokumentationen kan eventuelt baseres på et »Certificate of Suitability« fra EDQM.

#### *Restsolventer i lægemidler*

Lægemidler til human anvendelse skal opfylde CPMP/ICH guideline Q3C (R5) »Impurities: Guideline for Residual Solvents« (EMA/CHMP/ICH/82260/2006), gengivet i Ph. Eur. kapitel 5.4. »Residual solvents« (no. 50400), vedrørende indhold af restsolventer. Til identifikation af restsolventer kan afsnittet »Identification and control of residual solvents« (no. 20424) i Ph. Eur. 2.4.24. anvendes.

#### *Pesticidrester*

Når der er mulighed for, at et lægemiddel, der helt eller delvist består af råvarer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, kan indeholde rester af pesticider eller andre bekæmpelsesmidler, skal lægemidlet opfylde de i Ph. Eur. kapitel 2.8.13. »Pesticide residues« (no. 20813) angivne kvalitetskrav.

### **Kontrol af lægemidler**

Lægemidler skal kontrolleres efter gældende GMP-regler, samt overholde de nedenfor angivne krav.

#### *Lægemiddelstof*

Det kvantitative indhold af lægemiddelstof i et lægemiddel må på fremstillingstidspunktet sædvanligvis højst afvige 5 % fra det deklarerede.

På grundlag af holdbarhedsundersøgelser vil en større afvigelse, sædvanligvis indtil 10 % for den nedre grænse som følge af nedbrydning inden for opbevaringstiden, kunne godkendes.

#### *Faktisk indhold*

Det gennemsnitlige indhold af lægemidlet i forbrugerpakningen skal være tilstrækkeligt til, at det deklarerede indhold (antal, masse eller volumen) kan udtages under anvendelse af sædvanlig teknik.

### *Dosis- og massevariation*

Enkeltdoserede lægemidler skal enten overholde kravene beskrevet i Ph. Eur. 2.9.40 eller kravene til dosis og massevariation beskrevet i henholdsvis Ph. Eur. 2.9.5 »Uniformity of mass of single-dose preparations« (no. 20905) og Ph. Eur. 2.9.6. »Uniformity of content of single-dose preparations« (no. 20906).

Kravene i Ph. Eur. 2.9.40 gælder ikke for naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler.

Kvalitetskrav vedrørende dosisvariation i Ph. Eur. kapitel 2.9.6. »Uniformity of content of single-dose preparations« og i Ph. Eur. 2.9.40 »Uniformity of dosage units« gælder ikke for multivitamin- og mineralpræparater.

Orale lægemiddelformer i flerdosisbeholdere skal overholde prøven i Ph. Eur. 2.9.27. »Uniformity of mass of delivered doses from multidose containers« (no. 20927).

### *Mikrobiel renhed*

Lægemidler, der skal være sterile i henhold til standarden for den pågældende lægemiddelform og lægemidler, hvor det af mærkningen fremgår, at de er sterile, skal overholde prøven for "Sterility" i Ph. Eur. kapitel 2.6.1

Ikke-sterile lægemidler skal overholde de krav til mikrobiel renhed, som angives i Ph. Eur. kapitel 5.1.4. »Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use«. Plantelægemidler til oral anvendelse skal dog overholde kravene i Ph. Eur. kapitel 5.1.8 »Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparation«

### *Valg af analysemetode*

Såfremt der ved udførelse af prøverne skal vælges mellem analysemetoderne *membrane filtration*, *plate count* eller *serial dilution* vælges én af de to førstnævnte, hvor råvarens/produktets egenskaber tillader det. *Serial dilution* må kun anvendes, hvis råvaren/produktet har specielle egenskaber, der udelukker anvendelsen af én af de to andre metoder.

## **Opbevaring af lægemidler**

Lægemidler skal opbevares i beholdere, som beskytter indholdet mod kontaminering. Opbevaringsbeholdere må ikke påvirke indholdet på en sådan måde, at lægemidlet ikke fortsat opfylder specifikationen. Lægemidler skal i øvrigt opbevares i overensstemmelse med de opbevaringsbetingelser, der fremgår af specifikationen, og som er godkendt i forbindelse med registreringen.

## **Opbevaringsbetingelser**

Opbevaringsbetingelser fastsættes ifølge

Humane: Guideline on declaration of storage conditions: A: in the product information of medicinal products, B: for active substances (CHMP/QWP/609/96/Rev 2)

Veterinære: Guideline on declaration of storage conditions: A) in the product information of pharmaceutical veterinary medicinal products, B) for active substances (EMA/CVMP/422/99/ Rev 3)

### ***For mærkningen og teksten i produktresuméet for lægemidlet gælder følgende:***

| Holdbarhedsforsøg er udført ved (V)ICH betingelser.    | Tekst i produktresumé                         | Mærkning       | Tillægsmærkning samt tekst i produktresumé* |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Lægemidlet er stabilt ved højere temperaturer end 30°C | Ingen særlige opbevaringsbetingelser<br>eller | Ingen mærkning | Kan mærkes:                                 |

|                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen</p>                                                                               |                                                                                                                                                                                  | <p>Må ikke opbevares koldt og/eller må ikke fryses<br/>Må ikke fryses eller udsættes for frost**<br/><i>eller</i><br/>Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.<br/>Beskyt mod frost**</p>                 |
| <p>Lægemidlet er stabilt ved temperaturer op til 30°C</p>     | <p>Må ikke opbevares over 30°C<br/><i>eller</i><br/>Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C<br/><i>eller</i><br/>Opbevares ved temperaturer under 30°C</p>   | <p>Kan mærkes:<br/>Må ikke opbevares over 30°C<br/><i>eller</i><br/>Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C<br/><i>eller</i><br/>Opbevares ved temperaturer under 30°C</p>  | <p>Kan mærkes:<br/>Må ikke opbevares koldt og/eller må ikke fryses<br/>Må ikke fryses eller udsættes for frost**<br/><i>eller</i><br/>Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.<br/>Beskyt mod frost**</p> |
| <p>Lægemidlet er stabilt ved temperaturer op til 25°C</p>     | <p>Må ikke opbevares over 25°C<br/><i>eller</i><br/>Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C<br/><i>eller</i><br/>Opbevares ved temperaturer under 25°C</p>   | <p>Skal mærkes:<br/>Må ikke opbevares over 25°C<br/><i>eller</i><br/>Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C<br/><i>eller</i><br/>Opbevares ved temperaturer under 25°C</p> | <p>Kan mærkes:<br/>Må ikke opbevares koldt og/eller må ikke fryses<br/>Må ikke fryses eller udsættes for frost**<br/><i>eller</i><br/>Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.<br/>Beskyt mod frost**</p> |
| <p>Lægemidlet er stabilt ved temperaturer op til 5°C ±3°C</p> | <p>Opbevares i køleskab (2°C til 8°C)<br/><i>eller</i><br/>Opbevares og transporteres koldt (2°C til 8°C)</p>                                                     | <p>Skal mærkes:<br/>Opbevares i køleskab (2°C til 8°C)<br/><i>eller</i><br/>Opbevares og transporteres koldt (2°C til 8°C)</p>                                                   | <p>Kan mærkes:<br/>Må ikke fryses<br/>Må ikke fryses eller udsættes for frost**<br/><i>eller</i><br/>Må ikke nedfryses</p>                                                                                     |
| <p>Lægemidlet er kun stabilt i frossen tilstand</p>           | <p>Opbevares frossen ved X°C<br/><i>eller</i><br/>Opbevares og transporteres frossent ved X°C<br/><i>eller</i><br/>Opbevares i dybfryser (temperaturinterval)</p> | <p>Skal mærkes:<br/>Opbevares frossen ved X°C<br/><i>eller</i><br/>Opbevares og transporteres frossent ved X°C<br/><i>eller</i></p>                                              |                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                            |                                                                                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <i>eller</i><br>Opbevares og transporteres nedfrosset (temperaturinterval) | Opbevares i dybfryser (temperaturinterval)<br><i>eller</i><br>Opbevares og transporteres nedfrosset (temperaturinterval) |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

\* Hvis det er relevant suppleres de almindelige opbevaringsbetingelser med tillægsmærkning, som også skal fremgå af produktresuméet.

\*\* Gælder kun for veterinære lægemidler.

### ***Andre specielle opbevaringsbetingelser:***

|   |                      |                                                                                                                             |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Opbevaringsproblem   | Tillægsmærkning* samt tekst i produktresumé afhængig af emballagen. Alternativt kan tekst i gældende QRD template benyttes. |
| 1 | Følsom overfor fugt  | Opbevares i original beholder***, tæt tillukket                                                                             |
| 2 | Følsom overfor fugt  | Opbevares i original emballage                                                                                              |
| 3 | Følsom overfor lys** | Opbevares i original beholder***/emballage                                                                                  |
| 4 | Følsom overfor lys** | Beholderen*** opbevares i ydre karton****                                                                                   |

\* En forklaring på tillægsmærkningen skal fremgå af produktresumé, etiket og indlægsseddel, eks. for at beskytte mod lys eller for at beskytte mod fugt.

\*\* For evaluering henvises til Guidelines on Photostability (CHMP/ICH/279/95 hhv. CVMP/VICH 901/00)

\*\*\* Den aktuelle standardterm for beholderen skal anvendes, eks. blister, hætteglas etc.

\*\*\*\* Alternative betegnelser kan anvendes, hvis det er relevant.

Ovennævnte opbevaringsbetingelser kan kun anvendes, såfremt den ved ansøgningen fremlagte holdbarhedsdokumentation viser, at der er reelle problemer med fugt- eller lysfølsomhed, og at disse problemer ikke kan afhjælpes ved anvendelse af en mere egnet emballage.

### ***Opbevaringsbetingelser for sterile lægemidler efter åbning eller rekonstituering***

Opbevaringsbetingelser fastsættes ifølge Guideline on Maximum shelf-life for sterile products for human use after first opening or following reconstitution (CHMP/QWP/159/96) eller Guideline on Maximum shelf-life for sterile veterinary products after first opening or following reconstitution (CVMP/198/99).

For mærkningen og teksten i produktresuméet for lægemidlet gælder følgende:

| <b>Lægemidler</b>                        | <b>Mærkning samt tekst i produktresumé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukonserverede vandige sterile lægemidler | Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i x timer/dage ved y°C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8°C*, med mindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.<br>*Er den fysisk-kemiske stabilitet mindre end 24 timer ved 2-8 °C, skal tid og temperatur nedsættes tilsvarende, f.eks. ...må ikke overstige x timer ved 2-8 °C. |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konserverede vandige sterile lægemidler og ikke-vandige sterile lægemidler (eks. olieholdige) | Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i x timer/dage ved y°C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt kan præparatet maksimalt opbevares i z dage ved t°C*. Andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar.<br>*z og t skal dokumenteres, og z må under normale omstændigheder ikke overstige 28 dage. Opbevaringstiden z må ikke oversige opbevaringstiden x. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Opbevaringstid

Den fastsatte opbevaringstid kan ikke forlænges ved kold opbevaring af lægemidler.

### Bulkvarer:

Hvis der i fremstillingen af et lægemiddel indgår opbevaring af en bulkvare (holdetid) i mere end 30 dage, skal holdetiden dokumenteres ved holdbarhedsforsøg for bulkvaren, uanset hvordan start på opbevaringstiden er fastsat.

### Fastsættelse af start på opbevaringstiden:

Retningslinjerne i CHMP guidelinen »Start of shelf-life of the finished dosage form« (CPMP/QWP/072/96 og EMEA/CVMP/453/01) skal normalt følges. Udløbsdatoen skal fastsættes fra frigivelsesdatoen for batchen. Frigivelsesdatoen må, under normale omstændigheder, ikke overstige 30 dage fra fremstillingsdatoen. Såfremt tidsrummet mellem fremstilling og frigivelse overstiger 30 dage, skal fremstillingsdatoen anvendes som start på opbevaringstiden.

Hvis der afviges fra ovenstående guideline med hensyn til start på opbevaringstiden, skal batcher, der anvendes i holdbarhedsforsøgene for færdigvaren, have været opbevaret som bulkvare i den maksimale holdetid og herefter som færdigvare.

### Brugsanvisninger

For de anførte typer af lægemidler skal følgende brugsanvisninger påføres:

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lægemidler, hvori der kan dannes bundfald, eller i hvilke adskillelse i to faser kan finde sted.                                                                                                    | Omrystes.                                                          |
| Brusegranulater og -tabletter samt andre perorale lægemidler, der skal opløses før indtagelse.                                                                                                      | Opløses i ... glas vand.                                           |
| Sugetabletter.                                                                                                                                                                                      | Bør ikke tygges.                                                   |
| Tabletter, opløselige.                                                                                                                                                                              | Opløses i ... glas vand. Opløsningen bliver uklar. (Når relevant). |
| Cytostatiske lægemidler til oral indgift (»lukkede lægemiddelformer«), visse orale entero- og depotlægemidler samt andre orale lægemidler, som pga. ubehagelig smag eller lignende bør synkes hele. | Synkes hele.                                                       |
| Resoribletter                                                                                                                                                                                       | Anbringes under tungen.                                            |
| Suppositorier og rektaltamponer.                                                                                                                                                                    | Til indføring i endetarmen.                                        |
| Vagitorier og vaginaltamponer.                                                                                                                                                                      | Til indføring i skeden.                                            |

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle brugsfærdige lægemidler til injektion. | Applikationsmåde f.eks.:<br>i.v. (intravenøst), i.m. (intramuskulært) og/eller s.c. (subkutan). |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Udformningen af de angivne brugsanvisninger kan omformuleres, når meningen ikke ændres.

Andre oplysninger, som kan indgå i en brugsanvisning, er f.eks. »Munden skylles med vand efter hver inhalation«, »Kan misfarve hud, hår og tøj«, »Kan give lokal irritation med forbigående, let brænden«, »Kan bevirke farvning af urin/afføring«, »Indtages med mindst ½ glas vand eller anden væske«, »Indtages i forbindelse med/mellem måltider«.

### Magistrelle lægemidler

Magistrelle lægemidler er lægemidler, der tilberedes på apotek/sygehusapotek til den enkelte patient eller det enkelte dyr efter recept fra en læge eller dyrlæge (jf. § 11 stk. 1, i lov om lægemidler).

Ved ordination af et magistrelt lægemiddel fra et apotek gælder § 13 i lov om apoteksvirksomhed. Sygehusapoteker er ikke omfattet af § 13 i apotekerloven.

Et sygehusapotek kan foretage færdigtilberedning af lægemidler efter bekendtgørelse nr. 477 af 8. maj 2013 om færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapoteker. Færdigtilberedninger foretaget efter bekendtgørelse om færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapoteker er ikke omfattet af kravene til magistrelle lægemidler.

Magistrelle lægemidler kan fremstilles og lagerholdes på apotek/sygehusapotek til senere ordination til den enkelte patient eller til det enkelte dyr.

Magistrelle lægemidler dækker over flere principielt forskellige måder at fremstille lægemidler på jf. nedenfor.

1. Patientspecifik magistrel fremstilling eller færdigopblanding af et registreret lægemiddel eller lægemiddel efter udleveringstilladelse, hvor hvert færdigopblandet lægemiddel er unikt (enkeltenhed). Hver batchjournal indeholder en enhed.

2. Seriefremstilling af enkeltenheder er færdigopblanding af registrerede lægemidler eller lægemidler efter udleveringstilladelse, fremstillet lige efter hinanden, hvor hvert færdigopblandet lægemiddel er ens. Hver batchjournal kan indeholde flere ens enheder med samme batchnummer.

3. Bulkproduktion hvor fremstillingen foregår ud fra registrerede lægemidler/lægemidler efter udleveringstilladelse eller aktive stoffer til en homogen blanding. Ud fra denne blanding fremstilles et antal ens enheder. Hver batchjournal indeholder ens enheder med samme batchnummer.

*Skema 1: Skematisk opdeling af typer af magistrelle lægemidler og deres fremstilling jf. (1), (2) og (3) som ovenfor angivet.*

|    | Magistrelt lægemiddel                                                       | Patient<br>specifik<br>(1.) | Seriefremstillede<br>enkeltenheder<br>(2.) | Bulk<br>(3.) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1. | Cytostatika – færdigtilberedninger                                          | X                           | X                                          |              |
| 2. | Andre færdigopblandede lægemidler<br>(f.eks. antibiotika, smerteblandinger) | X                           | X                                          |              |
| 3. | Total parenteral ernæring                                                   | X                           | X                                          |              |

|    |                                                                                     |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 4. | Koblede produkter                                                                   |   | X |   |
| 5. | Påfyldninger/udportioneringer (f.eks. smertekassetter)                              | X | X |   |
| 6. | Reformulering af lægemiddel (f.eks. suspension af tablet)                           | X | X |   |
| 7. | Fremstilling af magistrelt lægemiddel ud fra en bulk af et registreret lægemiddel   |   |   | X |
| 8. | Fremstilling ud fra aktivt stof (traditionel magistrel fremstilling ud fra råvarer) | X |   | X |

For så vidt angår analyse af de i skema 1 angivne typer af magistrelle lægemidler, så henvises der til senere tekst om kontrol af magistrelle lægemidler.

Magistrelle lægemidler skal fremstilles, kontrolleres og lagerholdes i overensstemmelse med de for lægemidler i øvrigt gældende standarder i Den Europæiske Farmakopé, Danske Lægemiddelstandarder samt Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelser, dog med de tilpasninger, der fremgår af bestemmelserne i dette kapitels bestemmelser vedrørende magistrelle lægemidlers kvalitet.

### *Risikovurdering*

Et apotek/sygehusapotek, som fremstiller et lægemiddel magistrelt, skal foretage en dokumenteret risikovurdering af fordele og potentielle risici for patienten. Risikovurderingen skal indeholde en afvejning af det magistrelle lægemiddels særlige værdi og risiko ved manglende adgang til lægemidlet versus de risici, der er ved, at magistrelle lægemidler ikke lever op til de samme strenge krav som gælder for fremstillingen af markedsførte lægemidler, samt at sikkerhed og effekt normalt ikke er dokumenteret for magistrelle lægemidler. De i skema 1 førstnævnte seks typer af fremstilling af magistrelle lægemidler er undtaget for udarbejdelse af en risikovurdering. Disse er dog ikke undtaget for en farmaceutisk vurdering af fremstillingen jf. nedennævnte afsnit om produkt dossier.

Denne risikovurdering bør som minimum indeholde:

1. Fordele og potentielle risici for patienten ved anvendelse af det magistrelle lægemiddel (f.eks. skal anvendelsen af det magistrelle lægemiddel være til patientens fordel frem for et markedsført lægemiddel).
2. Lægemiddelform og administrationsvej (f.eks. udgør parenterale lægemidler en større risiko end salver/cremer).
3. Antal produktionsbatcher pr. år samt batchstørrelse (stor produktion udsætter flere patienter for risici)
4. Farmakologisk effekt af lægemidlet ved den aktuelle administrationsvej (f.eks. er stærkt virkende lægemidler en øget risiko).
5. Terapeutisk vindue (dosisinterval for terapeutiske doser). Snævert terapeutisk vindue er en øget risiko.
6. Type af fremstillingsproces (f.eks. udgør aseptisk fremstillede lægemidler en større risiko end terminalt steriliserede lægemidler).

For at kunne udarbejde risikovurderingen skal det apotek/sygehusapotek, som fremstiller det magistrelle lægemiddel, modtage alle relevante informationer om ordinationen eller en kopi af recepten fra det apotek/sygehusapotek, som har modtaget recepten/medicinrekvisitionen.

I de tilfælde hvor apoteket/sygehusapoteket, som fremstiller det magistrelle lægemiddel, vurderer, at risikovurderingen falder negativt ud, skal apoteket/sygehusapoteket, som fremstiller det magistrelle lægemiddel, forelægge risikovurderingen for den ordinerende læge, så lægen kan vurdere om ordinationen skal ændres.

### *Produktdossier*

For magistrelle lægemidler skal der udarbejdes et komplet produktdossier jf. punkt a til f nedenfor. Dette gælder også magistrelle lægemidler, som lagerholdes på den enkelte hospitalsafdeling og er fremstillet til unavngivne patienter.

Magistrelle lægemidler, som er fremstillet til umiddelbar udlevering til patienter, er ikke omfattet af kravet om et produktdossier før udleveringen af det magistrelle lægemiddel til patienten, hvis det kan føre til en forsinkelse i leveringen af et magistrelt lægemiddel, som er nødvendigt for patienten. Udleveringen fritager ikke fra kravet om, at produktdossier skal udarbejdes efterfølgende.

Et produktdossier skal, hvis relevant, indeholde følgende:

- a. Dokumentation for det magistrelle lægemiddels særlige værdi for patienten inklusiv risikovurderingen.
- b. Dokumentation for at aktive stoffer, hjælpestoffer og emballage opfylder relevante krav, under hensyntagen til specifikke patienters behov.
- c. Beskrivelse af fremstillingsprocessen i fremstillingsforskriften med angivelse af proceskontroller og en færdigvarespecifikation med tilhørende analysemetoder.
- d. Udviklings- og baggrundsdokumentation for fremstillingsprocessen.
- e. Beskrivelse af lægemidlets anvendelse inklusive relevante oplysninger til patienten og den ordinerende læge.
- f. Oplysning om holdbarhed og holdbarhedsdokumentation.

Indholdet og detaljeringsgraden af oplysningerne i produktdossieret, som er nævnt i punkt a til f ovenfor, afhænger af lægemidlets generelle risikoprofil. Produktdossier bør være mere omfattende for lægemidler, der indebærer en højere risiko, end for dem der indebærer en mindre risiko.

### *Opbevaring af produktdossier og risikovurderinger*

Apoteker og sygehusapoteker skal, efter anmodning eller i forbindelse med inspektion fra Lægemiddelstyrelsen, kunne fremvise produktdossierer og risikovurderinger.

### **Fremstilling af magistrelle lægemidler**

Magistrelle lægemidler skal fremstilles under forhold og betingelser, der efterlever reglerne i bekendtgørelse nr. 1358 af 18. december 2012 om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter.

### *Råvarer*

Råvarer til fremstilling af magistrelle lægemidler skal anvendes i en renhed og med tekniske egenskaber, der er egnet for det givne formål. Det er apotekets eller sygehusapotekets ansvar at sikre sig, at råvarernes kvalitet lever op til dagens standard. Som grundlag for kvalitetsbedømmelsen anvendes standarden i Den Europæiske Farmakopé eller, hvis en sådan ikke findes, en standard i en anden gældende farmakopé (en national farmakopé eller The United States Pharmacopoeia/National Formulary) eller i en tidligere dansk eller udenlandsk farmakopé. Hvis der ikke findes en standard for råvaren, skal der foretages en kvalitetsbedømmelse baseret på principperne i den gældende udgave af Den Europæiske Farmakopé. Apoteket eller sygehusapoteket skal i eget laboratorium analysere råvarerne eller have en kontrakt med et analyselaboratorium om at foretage kontrol af de råvarer, der skal anvendes til fremstilling af det magistrelle lægemiddel. Omfanget af kontrollen skal følge gældende GMP-regler.

Ved fremstilling af et magistrelt lægemiddel skal der desuden tages hensyn til de tilgængelige oplysninger om råvarernes uforligelighed, tekniske egenskaber og retningslinjer for deres varmebehandling samt andre forhold af betydning for deres anvendelse, som er relevante for det pågældende lægemiddel. Der skal også tages hensyn til de tilgængelige oplysninger om fremstillingsmåden for tilsvarende lægemidler.

Kilder for oplysninger om råvarer og lægemiddelfremstilling er primært den Europæiske Farmakopé, herunder den generelle monografi »Substances for pharmaceutical use«, og derudover bl.a. præparatmonografier i British Pharmacopoeia og United States Pharmacopoeia/National Formulary; tidligere officielle monografisamlinger samt værker som The Pharmaceutical Codex (The Pharmaceutical Press, London) og Martindale: The Extra Pharmacopoeia (The Pharmaceutical Press, London). Også elektroniske medier som f.eks. Micromedex kan være en mulig kilde til information.

Ordineres et magistrelt lægemiddel under anvendelse af navnet på en farmaceutisk specialitet, men i en afvigende styrke, skal det magistrelle lægemiddel fremstilles under anvendelse af samme lægemiddelstof og den samme relation mellem specialitetens styrkeangivelse og indgående mængde lægemiddelstof. I den udstrækning, det er muligt, skal det magistrelle lægemiddel fremstilles under anvendelse af det/de samme hjælpestoffer, som er anvendt i den farmaceutiske specialitet.

Ordineres et magistrelt lægemiddel under angivelse af navnet på et lægemiddel, der er beskrevet i en tidligere gældende monografisamling eller i en udenlandsk monografisamling, skal det magistrelle lægemiddel fremstilles i overensstemmelse med forskriften i den pågældende monografisamling.

Ordineres et magistrelt lægemiddel fremstillet uden tilsætning af konserveringsstof skal der ses bort fra eventuelle bestemmelser om konservering i den tilhørende lægemiddelformstandard.

Ved fremstilling af magistrelle lægemidler bør der anvendes almindeligt anvendte hjælpestoffer. Visse magistrelle lægemidler skal, som det fremgår af Tillæg til lægemiddelformstandarder senere i denne sektion, fortrinsvist fremstilles under anvendelse af bestemte hjælpestoffer eller mellemprodukter.

Magistrelle lægemidler, der er ordineret som opløsninger i vand, sprit eller olie, skal fremstilles som opløsninger i henholdsvis rensset vand, ethanol 96 % eller jordnøddolie.

### *Mellemprodukter*

Det er ved fremstillingen af magistrelle lægemidler tilladt at anvende mellemprodukter, når den tilsigtede virkning af lægemidlerne ikke påvirkes heraf. Ordineres et mellemprodukt som lægemiddel, skal det håndteres i overensstemmelse med den relevante lægemiddelformstandard og benævnes med den relevante standardterm.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekokt      | Mellemprodukter, der er drogeudtræk fremstillet ved overhældning af drogen med vand og påfølgende opvarmning i vandbad, betegnes dekokter. Sædvanligvis fremstilles 10 dele dekokt ud fra 1 del droge. Dekokter må ikke opbevares.                      |
| Diluendum   | Mellemprodukter, der er stamopløsninger af råvarer eller flydende drogeudtræk af angiven styrke, betegnes diluenda. Det kvantitative indhold af lægemiddelstof i et diluendum må højst afvige 5% fra det tilstræbte.                                    |
| Infus       | Mellemprodukter, der er drogeudtræk, fremstillet ved overhældning af drogen med kogende vand og påfølgende henstand, betegnes infuser. Sædvanligvis fremstilles af 1 del droge 10 dele infus. Infuser må ikke opbevares.                                |
| Trituration | Mellemprodukter, der er udrivninger af et eller flere lægemiddelstoffer med faste, flydende eller salveagtige hjælpestoffer, betegnes triturationer. Det kvantitative indhold af lægemiddelstof i en trituration må højst afvige 5% fra det tilstræbte. |

### *Isotoniske vandige opløsninger*

Vandige opløsninger, der har samme osmotiske tryk som blod, tåre- og vævsvæskerne, betegnes isoosmotiske. En 0,9 % natriumchloridopløsning, en 1,6 % kaliumnitratopløsning, en 3,9 % natriumsulfatdecahydratopløsning og en 2,3 % glycerolopløsning er isoosmotiske og har en frysepunktssænkning på 0,52 °C.

En isoosmotisk opløsning er isotonisk med blod, tåre- og vævsvæskerne, med mindre det opløste stofs molekyler er i stand til at passere over den aktuelle biologiske barriere.

Vandige opløsninger kan sædvanligvis gøres isotoniske ved at tilsætte natriumchlorid i en sådan mængde, at opløsningens frysepunktssænkning bliver  $0,52^{\circ}\text{C}$ . Hvis natriumchlorid bevirker udfældning, kan som isotonigivende stof anvendes f.eks. glycerol, kaliumnitrat (især øjendråber og øjenbadevand) eller natriumsulfatdecahydrat. For magistrelle øjendråber og magistrelt øjenbadevand er det sædvanligvis ikke nødvendigt at korrigere for den isotoniændring, som det konserverende stof medfører.

Beregning af den isotonigivende mængde stof kan ske ved hjælp af tallene i nedenstående tabel. Hvis lægemiddelstoffet ikke er optaget i tabellen, kan stoffets natriumchloridækvivalent, d.v.s. det antal gram natriumchlorid, som 1 g af det pågældende stof erstatter i osmotisk henseende, beregnes som beskrevet i det efterfølgende afsnit. Den beregnede værdi skal efterprøves eksperimentelt ved måling af opløsningens frysepunktsænkning som beskrevet i »Osmolality«, Ph. Eur. 2.2.35.

**Isotonitabel** I kolonne I er angivet det antal gram natriumchlorid, som 1 gram af det pågældende stof erstatter i osmotisk henseende. Ved hjælp af disse værdier beregnes, hvor mange g natriumchlorid som må tilsættes, for at en opløsning skal blive isotonisk (svarer til 0,9 % natriumchloridopløsning).

I kolonne II er angivet det antal g vand, som 1 g af det pågældende stof må opløses i for at give en isotonisk opløsning.

Lægemidlet indstilles på ønsket styrke ved yderligere tilsætning af isotonisk væske. Til injektionsvæsker anvendes sædvanligvis 0,9 % natrium-chloridopløsning som fortyndingsmiddel.

Beregningseksempler:

|                  | I    | II |
|------------------|------|----|
| Lægemiddelstof A | 0,14 | 15 |
| Lægemiddelstof B | 0,16 | 17 |

Eksempel: Lægemiddelstof A injektionsvæske 2% 20 ml.

20 ml isotonisk natriumchloridopløsning svarer til 0,180 g NaCl

0,40 g Lægemiddelstof A svarer til  $0,40 \cdot 0,14 = 0,056$  g NaCl

Der må tilsættes  $0,180 - 0,056 = 0,124$  g NaCl

Eksempel: Lægemiddelstof B øjendråber 1% 10 g.

Øjendråberne skal indeholde:

0,1 g Lægemiddelstof B,

$0,1 \cdot 17 = 1,70$  g sterilt vand,

konserveringsmiddel,

steril 0,9 % natriumchloridopløsning

til en samlet vægt af 10 g.

|  | I | II |
|--|---|----|
|--|---|----|

|                                           |         |     |
|-------------------------------------------|---------|-----|
| Adrenalintartrat                          | 0,16    | 17  |
| Alun                                      | 0,15    | 16  |
| Amfetaminsulfat                           | 0,21    | 22  |
| Ammoniumchlorid                           | 1,13    | 125 |
| Amobarbitalnatrium                        | 0,25    | 27  |
| Antazolinhydrochlorid                     | 0,22    | 23  |
| Apomorphinhydrochloridhemihydrat          | 0,14    | 15  |
| Ascorbinsyre                              | 0,18    | 19  |
| Atropinsulfat                             | 0,10    | 10  |
|                                           |         |     |
| Bacitracin 0–5 %                          | 0,04    | 3   |
| Benzalkoniumchlorid                       | 0,03    | 3   |
| Benzylalkohol                             | 0,16    | 17  |
| Benzylpenicillinnatrium                   | 0,16    | 17  |
| Borax 0–1,0 %                             | 0,43    | 47  |
| Borax over 1,0 %                          | 0,36    | 39  |
| Borsyre                                   | 0,48    | 52  |
|                                           |         |     |
| Calciumchloridhexahydrat                  | 0,36    | 39  |
| Calciumgluconat                           | 0,14    | 15  |
| Calciumlactatpentahydrat                  | 0,21    | 22  |
| Calciumlevulinatdihydrat                  | 0,26    | 28  |
| Calciumpantothenat                        | 0,17    | 18  |
| Carbachol                                 | 0,33    | 36  |
| Cetrimid 0–5,0 %                          | 0,08    | 8   |
| <i>Chinidinsulfat se Kinidinsulfat</i>    |         |     |
| <i>Chloramin se Tosylchloramidnatrium</i> |         |     |
| Chloramphenicol                           | 0,10    | 10  |
| Chlorhexidindiacetat                      | 0,18 i) | 19  |
| Chlorbutanolhemihydrat                    | 0,24    | 26  |
| Chlorpromazinhydrochlorid 0–2,0 %         | 0,08    | 8   |
| Chlorpromazinhydrochlorid 2,1–4,0 %       | 0,05    | 5   |
| Chlorpromazinhydrochlorid 4,1–5,0 %       | 0,03    | 2   |

|                                       |      |    |
|---------------------------------------|------|----|
| Cinchocainhydrochlorid<br>0–3,0 %     | 0,12 | 12 |
| Cinchocainhydrochlorid 3,1–5,0 %      | 0,08 | 8  |
| Cinchocainhydrochlorid 5,1–8,0 %      | 0,06 | 6  |
| Citronsyremonohydrat                  | 0,16 | 17 |
| Cocainhydrochlorid                    | 0,14 | 15 |
| Codeinhydrochloriddihydrat            | 0,15 | 16 |
| Codeinphosphatesesquihydrat           | 0,12 | 12 |
| Caffein                               | 0,08 | 8  |
|                                       |      |    |
| Dexpanthenol                          | 0,17 | 18 |
| Dihydrostreptomycinsulfat             | 0,05 | 5  |
| Dinatriumedetat                       | 0,20 | 21 |
| Dinatriumphosphatdihydrat             | 0,40 | 43 |
| Diphenhydraminhydrochlorid 0–2,0 %    | 0,24 | 26 |
| Diphenhydraminhydrochlorid 2,1–4,0 %  | 0,19 | 20 |
| Diphenhydraminhydrochlorid over 4,0 % | 0,17 | 18 |
| Diprophyllin 0–5,0 %                  | 0,09 | 9  |
| Diprophyllin over 5,0 %               | 0,08 | 8  |
|                                       |      |    |
| Ephedrinhydrochlorid                  | 0,28 | 30 |
| Ergometrinmaleat                      | 0,12 | 12 |
| Ergotamintartrat                      | 0,07 | 7  |
| Ethanol 96 %                          | 0,65 | 71 |
| Ethylendiaminhydrat                   | 0,44 | 48 |
| Ethylmorphinhydrochlorid              | 0,15 | 16 |
| Euflavin 0-3.0 %                      | 0,09 | 9  |
|                                       |      |    |
| Fluoresceinnatrium                    | 0,28 | 30 |
| Fructose                              | 0,18 | 19 |
|                                       |      |    |
| Garvesyre                             | 0,03 | 2  |
| Glucose, vandfri                      | 0,18 | 19 |
| Glucosemonohydrat                     | 0,16 | 17 |

|                                     |      |    |
|-------------------------------------|------|----|
| Glycerol                            | 0,41 | 44 |
| Glycerol (85 %)                     | 0,35 | 38 |
|                                     |      |    |
| Histamindihydrochlorid              | 0,40 | 43 |
| Homatropinhydrobromid               | 0,16 | 17 |
| Hydromorphonhydrochlorid 0–2,0 %    | 0,20 | 21 |
| Hydromorphonhydrochlorid 2,1–4,0 %  | 0,16 | 17 |
| Hydromorphonhydrochlorid over 4,0 % | 0,15 | 16 |
| Hyoscinhydrobromid                  | 0,11 | 11 |
| Hyoscyaminsulfat 0–5,0 %            | 0,12 | 12 |
|                                     |      |    |
| Isoniazid                           | 0,22 | 23 |
|                                     |      |    |
| Kaliumchlorid                       | 0,76 | 83 |
| Kaliumiodid                         | 0,35 | 38 |
| Kaliumnitrat                        | 0,56 | 61 |
| Kaliumpermanganat                   | 0,39 | 42 |
| Kaliumsulfat                        | 0,43 | 47 |
| Kinidinsulfat                       | 0,10 | 10 |
| Kininhydrochlorid                   | 0,12 | 12 |
|                                     |      |    |
| Lactosemonohydrat                   | 0,09 | 9  |
| Lidocainhydrochlorid                | 0,21 | 22 |
|                                     |      |    |
| Magnesiumchloridhexahydrat          | 0,45 | 49 |
| Magnesiumsulfatheptahydrat          | 0,14 | 15 |
| Mannitol                            | 0,18 | 19 |
| Mepyraminmaleat 0–2,0 %             | 0,15 | 16 |
| Mepyraminmaleat 2,1–4,0 %           | 0,11 | 11 |
| Mepyraminmaleat 4,1–6,0 %           | 0,09 | 9  |
| Mercurichlorid                      | 0,10 | 10 |
| Metamizolnatriummonohydrat          | 0,19 | 20 |
| Methadonhydrochlorid<br>0–2,0 %     | 0,16 | 17 |

|                                         |          |     |
|-----------------------------------------|----------|-----|
| Methadonhydrochlorid<br>2,1–4,0 %       | 0,13     | 13  |
| Methadonhydrochlorid<br>4,1–6,0 %       | 0,12     | 12  |
| Methylthioniniumchlorid                 | 0,05 ii) | 5   |
| Morphinhydrochlorid                     | 0,14     | 15  |
| Mælkesyre                               | 0,40     | 43  |
|                                         |          |     |
| Naphazolinhydrochlorid                  | 0,24     | 26  |
| Natriumacetattrihydrat                  | 0,45     | 49  |
| Natriumbenzoat                          | 0,40     | 43  |
| Natriumcalciumedetat                    | 0,21     | 22  |
| Natriumchlorid                          | 1,00     | 110 |
| Natriumcitrat                           | 0,30     | 32  |
| Natriumdihydrogenphosphatdihydrat       | 0,33     | 36  |
| <i>Natriumedetat se Dinatriumedetat</i> |          |     |
| Natriumhydrogencarbonat                 | 0,65     | 71  |
| Natriumiodid                            | 0,38     | 41  |
| Natriummetabisulfit                     | 0,66     | 72  |
| Natriumpropionat                        | 0,61     | 67  |
| Natriumsalicylat                        | 0,36     | 39  |
| Natriumsulfatdecahydrat                 | 0,24     | 26  |
| Natriumthiosulfat                       | 0,30     | 32  |
| Neomycinsulfat 0–5,0 %                  | 0,09     | 9   |
| Neostigminbromid                        | 0,19     | 20  |
| Nicotinamid                             | 0,21     | 22  |
| Nicotinsyre                             | 0,25     | 27  |
| Nikethamid                              | 0,15     | 16  |
| Noradrenalin tartrat                    | 0,16     | 17  |
| Noscapinhydrochlorid                    | 0,07     | 7   |
|                                         |          |     |
| Ouabain                                 | 0,04     | 3   |
| Oxytetracyclinhydrochlorid 0–3,0 %      | 0,09     | 9   |
|                                         |          |     |
| Papaverinhydrochlorid                   | 0,11     | 11  |

|                                                |          |    |
|------------------------------------------------|----------|----|
| Pentobarbitalnatrium                           | 0,23     | 25 |
| Pethidinhydrochlorid                           | 0,19     | 20 |
| Phenazon                                       | 0,13     | 13 |
| Phenethanol                                    | 0,26     | 28 |
| Phenobarbitalnatrium                           | 0,23     | 25 |
| Phenol                                         | 0,33     | 36 |
| Phenylephrin                                   | 0,31     | 33 |
| Physostigminsalicylat                          | 0,16     | 17 |
| Pilocarpinhydrochlorid                         | 0,22     | 23 |
| Pilocarpinnitrat                               | 0,20     | 21 |
| Polymyxin B sulfat<br>0–5,0 %                  | 0,05     | 5  |
| Procainamidhydrochlorid                        | 0,18     | 19 |
| Procainhydrochlorid                            | 0,18     | 19 |
| Promethazinhydrochlorid<br>0–2,0 %             | 0,14     | 15 |
| Promethazinhydrochlorid 2,1–4,0 %              | 0,10     | 10 |
| Promethazinhydrochlorid 4,1–5,0 %              | 0,08     | 8  |
| Propylenglycol                                 | 0,45     | 49 |
| Pyridoxinhydrochlorid 0–2,0 %                  | 0,34     | 37 |
| Pyridoxinhydrochlorid over 2,0 %               | 0,30     | 32 |
|                                                |          |    |
| <i>Quininhydrochlorid se Kininhydrochlorid</i> |          |    |
|                                                |          |    |
| Riboflavinatriumphosphat                       | 0,08     | 8  |
|                                                |          |    |
| Saccharose                                     | 0,10     | 10 |
| Saltsyre, fortyndet 2M                         | 0,12     | 12 |
| <i>ScopolaminHBr se HyoscinHBr</i>             |          |    |
| Sorbitol                                       | 0,16     | 17 |
| <i>Sprit, stærk se Ethanol 96 %</i>            |          |    |
| Streptomycinsulfat                             | 0,06     | 6  |
| Suxamethoniumchlorid                           | 0,20     | 21 |
| Sølvnitrat                                     | 0,33 iv) | 36 |
|                                                |          |    |

|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| <i>Tannin se Garvesyre</i>         |      |    |
| Tetracainhydrochlorid 0–3,0 %      | 0,16 | 17 |
| Tetracainhydrochlorid<br>3,1–5,0 % | 0,13 | 13 |
| Tetracainhydrochlorid<br>5,1–6,0 % | 0,11 | 11 |
| Tetracyclinhydrochlorid<br>0–3,0 % | 0,11 | 11 |
| Theophyllinmonohydrat              | 0,09 | 9  |
| Thiaminhydrochlorid                | 0,22 | 23 |
| Tosylchloramidnatrium              | 0,22 | 23 |
| Trimethadion                       | 0,21 | 22 |
|                                    |      |    |
| Vinsyre                            | 0,23 | 25 |
|                                    |      |    |
| Zinksulfatheptahydrat              | 0,12 | 12 |
|                                    |      |    |

- i) 0,18 g natriumchlorid svarer til 0,40 g natriumacetat
- ii) 0,05 g natriumchlorid svarer til 0,18 g natriumsulfat-decahydrat
- iii) 0,03 g natriumchlorid svarer til 0,11 g natriumsulfat-decahydrat
- iv) 0,33 g natriumchlorid svarer til 0,59 g kaliumnitrat

Beregning af  
natrium-chlori-  
dækvivalent

Den osmolære koncentration,  $\xi_m$  osmol/kg, af en opløsning udtrykkes normalt som:

$$\xi_m = v m \Phi$$

hvor  $m$  er opløsningens molalitet, d.v.s. antal mol pr. kg opløsningsmiddel.

Hvis det opløste stof er en ikke-elektrolyt er  $v = 1$ , mens værdien af  $v$  i øvrigt udtrykker antallet af ioner, der dannes i opløsningen ( $v = 1$  for glucose,  $v = 2$  for natriumchlorid,  $v = 3$  for calciumchlorid,  $v = 4$  for natriumcitrat).  $\Phi$  er den molale osmotiske koefficient, som tager højde for interaktioner mellem modsat ladede ioner.  $\Phi$  er desuden afhængig af  $m$ , men for opløsninger med koncentrationer i det fysiologiske område, ses normalt bort fra denne afhængighed.

Frysepunktsænkningen,  $\Delta T$  °C, af en vandig opløsning er proportional med den osmolære koncentration. Idet  $\xi_m$  udtrykkes i milliosmol (mosmol) pr. kg:  $\Delta T = 1,86 \xi_m / 1000$

hvor konstanten 1,86 er den molale frysepunktsænkning (°C) for vand.

Man kan af de to ovenstående ligninger beregne frysepunktsænkningen af en opløsning af kendt styrke eller koncentrationen af den opløsning, der har en frysepunktsænkning på  $0,52^{\circ}\text{C}$ , f.eks. koncentrationen af en isotonisk natriumchloridopløsning:  $\xi_m = (0,52 \times 1000)/1,86 = 279,6 \text{ mosmol/kg}$ . Idet  $v = 2$  for natriumchlorid, beregnes opløsningens molalitet  $m = 139,8 \text{ mmol/kg}$ , når der ses bort fra den molale osmotiske koefficient. Da molekylvægten af natriumchlorid er  $58,45 \text{ g}$ , er koncentrationen i g natriumchlorid/kg  $0,1398 \times 58,45 \text{ g/kg} = 8,17 \text{ g/kg}$  eller  $0,82\%$ . Da koncentrationen af den isotoniske opløsning er  $0,9\%$ , viser eksemplet, at man ikke kan se bort fra den molale osmotiske koefficient, som for en vandig opløsning af natriumchlorid har værdien  $0,91$ . Gentages beregningen af opløsningens molalitet, findes nu  $m = 153,6 \text{ mmol/kg}$  svarende til  $8,98 \text{ g}$  natriumchlorid pr kg vand, eller  $0,9\%$ .

Den følgende tabel viser tilnærmede værdier for den molale frysepunktsænkning for vandige opløsninger af forskellige elektrolytter og ikke-elektrolytter. Værdien af den molale frysepunktsænkning er jfr. ovenstående ligninger  $1,86 \text{ v } \Phi$ .

|                            | Molal frysepunktsænkning | Stofeksempler                      |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Ikke-elektrolyt            | 1,86                     | Glucose, saccharose, glycerol      |
| Svag elektrolyt            | 2,0                      | Borsyre, alkaloidbaser             |
| Di-divalent elektrolyt     | 2,0                      | Zinksulfat, magnesiumsulfat        |
| Mono-monovalent elektrolyt | 3,4                      | Natriumchlorid, cocainhydrochlorid |
| Mono-divalent elektrolyt   | 4,3                      | Natriumsulfat, atropinsulfat       |
| Di-monovalent elektrolyt   | 4,8                      | Calciumchlorid                     |
| Mono-trivalent elektrolyt  | 5,2                      | Natriumcitrat                      |
| Tetraborat                 | 6,0                      | Natriumborat                       |

Den molale frysepunktsænkning anvendes til at beregne et stofs natriumchloridækvivalent, d.v.s. det antal gram natriumchlorid, som 1 gram af stoffet erstatter i osmotisk henseende. Zinksulfat har molvægten  $287,5$ . Frysepunktsænkningen af f.eks. 1 kg opløsning indeholdende 1 g zinksulfat skal være den samme som frysepunktsænkningen for 1 kg opløsning indeholdende  $Z$  g natriumchlorid. Produktet af antal mol og

den molale frysepunktsænkning skal derfor have samme værdi for de to opløsninger, d.v.s.

$$2,0 \times 1/287,5 = 3,4 \times Z/58,5 \text{ hvoraf beregnes, at } Z = 0,12.$$

### *Isohydriske vandige lægemidler*

Vandige opløsninger med en pH omkring 7,4 kaldes isohydriske, idet pH i blod, tåre- og vævsvæsker er omkring 7,4. pH i blodet er ved legemstemperatur mellem 7,30 og 7,45 og opretholdes i dette område ved hjælp af forskellige stødpudesystemer. Også tårevæsken besidder en vis, svag stødpudekapacitet, hvorimod vævsvæskerne i de fleste organer er uden stødpudekapacitet.

Ved fremstilling af magistrelle lægemidler, der er vandige opløsninger eller dispersioner, som er beregnet til at bringes i direkte kontakt med blod, tåre- eller vævsvæsker, bør det tilstræbes, at formuleringen er isohydrisk og, af hensyn til de fysiologiske forhold på applikationsstedet, uden stødpudeeffekt. Eventuel justering af formuleringens pH bør derfor fortrinsvist udføres ved hjælp af en opløsning af en stærk syre eller base, primært saltsyre eller natriumhydroxid.

Betimeligheden i at fremstille magistrelle lægemidler med afvigende pH beror på en farmaceutisk vurdering af hensyn til lægemidlets stabilitet, de fysiologiske forhold på applikationsstedet samt mængden af lægemiddel, der skal appliceres. Der findes ikke generelle regler for anvendelsen af ikke-isohydriske opløsninger og dispersioner, men følgende forhold kan tjene som en rettesnor.

Parenterale læge-Infusionsvæsker fremstilles normalt isohydriske og uden stødpudekapacitet. Opløsningsmidler med ikke-fysiologisk pH, men pH indenfor intervallet 4 til 8 og uden stødpudekapacitet, kan accepteres, når de indgives langsomt. Generelt bør basiske opløsninger undgås. Hvis der anvendes en stødpude, bør opløsningens pH ligge mellem 7,0 og 7,5. Organismens tolerance over for injektionsvæsker til intravenøs og intraarteriel injektion er generelt større end over for infusionsvæsker på grund af det mindre administrerede volumen. Anvendelsen af stødpude kan accepteres for opløsninger i det sure område. Toleransen over for injektionsvæsker med afvigende pH er i øvrigt stærkt afhængig af såvel det administrerede volumen som administrationsstedet, herunder blodgennemstrømning på applikationsstedet. Forholdene ved subkutan injektion er de mest kritiske, fordi der ikke er lokal stødpudeeffekt, og fordi den administrerede dosis kun langsomt fordeles i vævene.

Magistrelle lægemidler beregnet for injektion direkte på virkningsstedet, f.eks. intraoculær og intratekal injektion, bør være isohydriske og skal være uden stødpudeeffekt.

Øjendråber og øjen-badevand Vandige opløsninger og dispersioner anses normalt for irritationsfri, når pH ligger mellem 7 og 9. Hvis pH er mindre end ca. 6, vil øjendråber fremkalde øget tåresekretion. Hvis stabilitetshensyn nødvendiggør pH under 6, bør der ikke anvendes stødpude.

### **Tillæg til lægemiddelformstandarder**

Ved fremstilling af magistrelle lægemidler skal de regler, der fremgår af de tilhørende lægemiddelformstandarder, suppleres eller tilpasses i overensstemmelse med de følgende anvisninger og bestemmelser.

#### ***Creme***

Magistrelle cremer fremstilles, når intet andet er ordineret, med følgende cremegrundlag:

|            |    |                                          |              |
|------------|----|------------------------------------------|--------------|
| Basiscreme | I  | Polysorbat 80                            | 5 g          |
|            |    | Cetostearylalkohol, emulgerende (type B) | 50 g         |
|            |    | Paraffinolie                             | 50 g         |
|            |    | Glycerolmonostearat 40–50                | 60 g         |
|            | II | Methylparahydroxybenzoat                 | 1 g          |
|            |    | Glycerol 85%                             | 40 g         |
|            |    | Sorbitol                                 | 70 g         |
|            |    | Vand, rensat                             | <u>724 g</u> |
|            |    | 1000 g                                   |              |

I sammensmeltes ved ca. 70° C, og II, der forud er opvarmet til kogning og derefter afkølet til 65–70° C, tilblendes under omrøring. Blandingen omrøres jævnlgt under afkølingen. Hvid creme.

Blandingen af I og II tåler varmebehandling ved 100° C i 20 minutter.

Ved fremstilling af magistrelle cremer skal faste stoffer, der ikke opløses fuldstændig i cremegrundlaget, umiddelbart før anvendelsen sigtes gennem sigte 125.

Magistrelle cremer, der skal konserveres (emulsionscremer, der indeholder mere end 20% vand), kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%.

### *Gel*

Magistrelle geler, der skal konserveres, kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%.

### *Injektionsvæske*

Magistrelle injektionsvæsker, der ordineres i enkeltdosis-beholdere med et deklareret volumen på indtil 20 ml, skal være tilsat følgende overskud af injektionsvæske, beregnet i forhold til det nominelle volumen:

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| - indtil 0,75 ml                | 20% |
| - over 0,75 ml og indtil 7,5 ml | 10% |
| - over 7,5 ml                   | 5%  |

Magistrelle injektionsvæsker, der skal konserveres, kan konserveres med 1% benzylalkohol, 0,5% phenol, 0,1% chlorcresol eller 0,1% methylparahydroxybenzoat.

### *Kutane væsker*

Magistrelle kutane væsker, der skal konserveres (f. eks. slim), kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%.

### *Næsedråber*

Magistrelle næsedråber, der skal konserveres, kan konserveres med 0,01% benzalkoniumchlorid + 0,05% natriumedetat.

*Orale dråber*

Magistrelle dråber, der skal konserveres, kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%; eller med 0,05% kaliumsorbat.

*Oralt pulver*

Ved magistrel fremstilling af oralt pulver skal, hvis en råvare optræder i kvaliteter med forskellig densitet, vælges den kvalitet, som har den mindste densitet.

*Oralt pulver, enkeltdosisbeholder*

Magistrelle orale pulvere i endosisbeholdere skal veje mindst 500 mg. Orale pulvere indeholdende lægemiddelstof i mindre mængde tilsættes lactose eller andet indifferent hjælpestof, således at det enkelte pulvers masse bliver 500 mg.

Ved magistrel fremstilling af orale pulvere i endosisbeholder skal, hvis en råvare optræder i kvaliteter med forskellig densitet, vælges den kvalitet, som har den mindste densitet.

*Orale væsker*

Magistrelle orale væsker, der skal konserveres, kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%; eller med 0,05% kaliumsorbat.

*Pudder*

Ved magistrel fremstilling af pudder skal, hvis en råvare optræder i kvaliteter med forskellig densitet, vælges den kvalitet, som har den laveste densitet.

*Salve*

Ved fremstilling af magistrelle salver skal faste stoffer, der ikke opløses fuldstændig i salvegrundlaget, umiddelbart før anvendelsen sigtes gennem sigte 125.

Magistrelle salver, der skal konserveres, kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%.

*Suppositorier*

Magistrelle suppositorier fremstilles, når ikke andet er ordineret, med hårdfedt som grundmasse og fortrinsvis ved støbning.

Faste stoffer, der er uopløselige i grundmassen, skal umiddelbart før anvendelsen sigtes gennem sigte 125.

Til fremstilling af suppositorier med et lavt indhold af lægemiddelstof (10 mg og derunder) er det tilladt at anvende dette i form af en trituration med lactose. Suppositorier, fremstillet med en grundmasse på fedtbasis, skal opbevares koldt

*Tabletter*

Ved magistrel fremstilling af ikke-overtrukne tabletter skal det i tabellen angivne system følges i størst mulig udstrækning.

| Indhold af<br>lægemiddelstof mg | Diameter<br>mm | Tilstræbt<br>bruttomasse mg ca | Grænser for<br>bruttomasse mg |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|

|            |      |                |                   |
|------------|------|----------------|-------------------|
| 0 – 50     | 6    | 100            | 90-110            |
| 51 – 100   | 8    | 180            | 160-200           |
| 101 – 250  | 10   | 350            | 325-375           |
| 251 – 350  | 12   | 450            | 400-500           |
| 351 – 450  | 12   | 550            | 500-600           |
| 451 – 550  | 13,5 | 650            | 600-700           |
| 551 – 650  | 13,5 | 750            | 700-800           |
| 651 – 1200 | 15   | delelig med 25 | (eks. : 950-1050) |

Tabletterne skal fremstilles i cirkelrund form med plane flader og skrå kant og skal med diameter 8-13,5 mm være forsynet med delekærv. Tabletter med diameter 6 mm må ikke forsynes med delekærv. Foreskrives tabletter, der indeholder 50 mg lægemiddelstof eller derunder, forsynet med delekærv, skal tabletterne fremstilles med diameter 8 mm (tilstræbt bruttomasse 180 mg).

Ved magistrel fremstilling af tabletter skal, hvis en råvare optræder i kvaliteter med forskellig densitet, vælges den kvalitet, som har størst densitet.

Lægemiddelstoffer, hvis opløselighed i vand er mindre end ca. 3 mg per ml, skal, medmindre nedenævnte metode A anvendes, opfylde følgende prøve for partikelstørrelse:

Lægemiddelstoffet fordeles i en væske med gode dispergeringsegenskaber, hvori stoffet ikke opløses. Ved mikroskopisk undersøgelse af suspension svarende til 10 µg af den faste fase må højst findes 20 partikler, hvis største dimension overstiger 25 µm, og heraf må højst 2 overstige 50 µm, medens ingen partiklers største dimension må overstige 90 µm.

Ved fremstilling af tabletter med et lavt indhold (5 mg og derunder) af lægemiddelstof kan blandingen af lægemiddelstof og hjælpestoffer fremstilles efter en af de nedenfor angivne metoder, idet metode A bør anvendes, når indholdet af lægemiddelstof er 1 mg og derunder.

Metode A: Lægemiddelstoffet opløses, om fornødent ved svag opvarmning, i et egnet flygtigt opløsningsmiddel, hvorefter den for tablet fremstillingen nødvendige mængde lactose (som mindst udgør 60 % af den tilstræbte bruttomasse) gennemfugtes med opløsningen, idet der skylles efter 2 gange, hver gang med ca. 10 % af den anvendte mængde opløsningsmiddel. Blandingen omrøres, til den er ensartet fugtet, og hensættes under omrøring, til den er tør. Efter sigtning (sigte 180) tilblandes stivelse og eventuelle andre stoffer, og blandingen sigtes.

Metode B: Lægemiddelstoffet (sigte 125) udrives med den for tablet fremstillingen nødvendige mængde lactose (sigte 125), og blandingen sigtes. Stivelse og eventuelle andre stoffer tilblandes, og blandingen sigtes.

### *Vagitorier*

Magistrelle vagitorier, der fremstilles ved støbning, fremstilles som anført for suppositorier.

### *Øjenbadevand, øjendråber og øredråber*

Magistrelt øjenbadevand, samt magistrelle vandige øjendråber og øredråber skal underkastes en varmebehandling ved den højeste temperatur, det pågældende lægemiddel må udsættes for; hvis lægemidlet fremstilles ex tempore, er det i stedet for varmebehandling dog tilladt at anvende filtrering gennem bakterieretentivt filter, f.eks. et membranfilter med porevidde 0,22 µm.

Magistrelt øjenbadevand og magistrelle øjendråber, der skal konserveres, kan konserveres med 0,5 % phenethanol eller med 0,01 % benzalkoniumchlorid + 0,05% natriumedetat. Magistrelle øredråber, der skal konserveres, kan konserveres med 0,5 % phenethanol.

Diluenda og opløsningsmidler til fremstilling af øjenbadevand, øjendråber eller øredråber, der har været underkastet en varmebehandling i opbevaringsbeholderne, må opbevares i indtil 2 år, såfremt beholderne er forsynet med tætsluttende lukke. Når en beholder er anbrudt, må indholdet højst opbevares 1 måned; denne begrænsning gælder ikke for diluenda af konserveringsstoffer og af lægemiddelstoffer med tilstrækkelig baktericid virkning. På koldt sted må opbevaring kun finde sted i ikke anbrudt beholder med tætsluttende lukke.

### Øjensalve

Magistrelle øjensalver fremstilles, når intet andet er ordineret, med følgende øjensalvegrundlag:

|                |    |              |        |
|----------------|----|--------------|--------|
| Basisøjensalve | I  | Paraffinolie | 200 g  |
|                | II | Vaselín      | 800 g  |
|                |    |              | 1000 g |

II smeltes på vandbad, I tilsættes, og blandingen afkøles under omrøring. Varmebehandles ved 140°C i 3 timer. Blanding vil fremstå som en gul salve.

Ved fremstilling af magistrelle øjensalver skal faste stoffer, der ikke opløses fuldstændigt i salvegrundlaget, umiddelbart før anvendelsen sigtes gennem sigte 125.

### Kontrol af magistrelle lægemidler

I medfør af § 27, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1358 af 18. december 2012 om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter kan fremstilling af magistrelle lægemidler, fritages for prøveudtagning, afprøvning og opbevaring af referenceprøver, i de tilfælde hvor der kun fremstilles en enkelt eller nogle få pakninger.

Patientspecifikke magistrelle lægemidler (til enkeltpatienter) og seriefremstillede (enkeltenheder jf. skema 1) magistrelle lægemidler undtages fra krav om analyse. Magistrelle lægemidler fremstillet ud fra en bulkproduktion skal analyseres i henhold til de i skema 2 angivne retningslinjer.

Lægemidler, der indeholder ikke veldefinerede lægemiddelstoffer, kan for disse stoffers vedkommende nøjes med at blive underkastet en simplificeret identitetskontrol (gælder ikke parenterale lægemidler og øjendråber).

Topikale lægemidler, hvis aktive stoffer kun indeholder zinkoxid, svovl og/eller salicylsyre, kan undtages fra afprøvning.

Der skal, ud over det i skema 2 anførte, fastlægges et program for mikrobiologisk analyse af ikke-sterile magistrelle lægemidler.

Analyser skal, når disse er beskrevet i Den Europæiske Farmakopé, udføres i henhold til denne beskrivelse.

Det kvantitative indhold af lægemiddelstof i et magistrelt lægemiddel må højst afvige 10 % fra det deklarerede indhold.

Der skal udtages en referenceprøve af hver batch som analyseres.

### Skema 2: Test af magistrelle lægemidler.

| Lægemiddelform | Batchstørrelse (patientpakninger) | Minimumskrav | Frekvens |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------|
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------|

|                                                                                                                    |                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parenteralia<br>Øjendråber<br>Sterile øredråber                                                                    | $\geq 3$ (parenteralia)<br>$\geq 6$ (øjendråber og sterile øredråber) | Kvantitativ bestemmelse                         | Hver batch                                                                                                                                       |
|                                                                                                                    |                                                                       | Bioburden (initial kimal)                       | Hver batch                                                                                                                                       |
|                                                                                                                    |                                                                       | Sterilttest af aseptisk fremstillede lægemidler | Hver batch                                                                                                                                       |
|                                                                                                                    |                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                  |
| Parenteralia                                                                                                       | $\geq 3$                                                              | Bakterieendotoxiner                             | Første batch og herefter hver 3. batch dog mindst en gang hvert halve år                                                                         |
| Orale lægemidler, suppositorier, vagitorier, næsedråber, øredråber (ikke sterile), topikale lægemidler og lignende | $> 10$ eller 3-10 mere end to gange per måned                         | Kvantitativ bestemmelse                         | Hver batch (topikale lægemidler dog kun hver 3. batch hvis begrundet i en risikovurdering)                                                       |
| Faste, doserede orale lægemidler, suppositorier, vagitorier m.v.                                                   | $> 10$ eller 3-10 mere end to gange per måned                         | Henfaldstid                                     | Første batch og herefter hver 3. batch                                                                                                           |
|                                                                                                                    |                                                                       | Dosisvariation (Ph. Eur. 2.9.40)                | Første batch og herefter hver 9. batch eller når der foretages ændringer i fremstillingsprocessen, som vil kunne påvirke udfaldet af analyserne. |
|                                                                                                                    |                                                                       | Massevariation (Ph. Eur. 2.9.40)                |                                                                                                                                                  |

## Opbevaring af magistrelle lægemidler

### Opbevaringsbetingelser

Opbevaring i vel tillukket beholder skal foretages således, at indholdet på betryggende måde er beskyttet mod forvitring, fordampning eller mod fri tilgang af luftens fugtighed, oxygen og carbondioxid m.v.

Opbevaring i lufttæt tillukket beholder skal foretages således, at luftudveksling med omgivelserne er udelukket.

Opbevaring over tørremiddel skal foretages i vel tillukket beholder eller skab, hvori der er anbragt et egnet tørremiddel.

Opbevaring beskyttet mod lyset skal ske enten på et for lys utilgængeligt sted eller i beholder eller pakning af et sådant materiale, at kortbølget, ultraviolet lys absorberes tilstrækkeligt til at beskytte indholdet mod nedbrydning eller forandring forårsaget af et sådant lys, eller i pakning beskyttet af en yderpakning som giver en sådan beskyttelse.

Opbevaring udelukket fra lyset skal foretages i beholder eller pakning, som er uigennemtrængelig for lys.

### *Opbevaringstid*

Magistrelle lægemidlers opbevaringstid kan eksempelvis fastsættes ud fra holdbarhedsdokumentation, information fra artikler, produktresumé fra lægemiddel på markedet, eller ud fra kendskab til holdbarhedstid af et tilsvarende tidligere markedsført lægemiddel. Fastsættelse af magistrelle lægemidlers holdbarhedstid skal være velbegrunderet og dokumenteret. Opbevaringstiden må højst fastsættes til 2 år, vurdering af holdbarhed for eventuelle mellemprodukter skal indgå. Lægemedelstyrelsen kan på grundlag af resultaterne af udførte holdbarhedsforsøg give tilladelse til en længere opbevaringstid.

### **Lægemedler til beredskabssituationer, det militære forsvar, det statslige redningsberedskab eller øvrige beredskabsmyndigheder.**

Lægemedler til det militære forsvar, det statslige redningsberedskab eller øvrige beredskabsmyndigheder er lægemidler, der tilberedes på et sygehusapotek eller apotek til brug for beredskabssituationer, hvor lægemidlet ikke kan erstattes af her i landet markedsførte lægemidler.

Der skal være tale om fremstilling af lægemidler, som er opført på lægemiddelstyrelsens liste over lægemidler til brug i antidotberedskabet og det militære forsvars internationale missioner, som kan købes uden for apoteker. Lægemedelstyrelsen udfærdiger listen i henhold til § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse fra apoteksforbeholdet.

Apoteker, som har meddelt Lægemedelstyrelsen, at de ønsker at fremstille magistrelle lægemidler, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om apoteksvirksomhed, kan fremstille lægemidler til beredskabssituationer i henhold til § 12 b i lov om apoteksvirksomhed.

Sygehusapoteker kan fremstille lægemidler til beredskabssituationer i henhold til § 56 a i lov om apoteksvirksomhed.

Apoteker og sygehusapoteker må udelukkende fremstille lægemidler til det militære forsvar, det statslige redningsberedskab eller øvrige beredskabsmyndigheder, som må indkøbe og udlevere lægemidler opført på Lægemedelstyrelsens liste uden for apotek, til oplæg i beredskabslagre eller til brug i internationale missioner efter § 7 i bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse fra apoteksforbeholdet.

### *Fremstilling*

Fremstilling skal foregå under forhold og betingelser, der efterlever reglerne i bekendtgørelse nr. 1358 af 18. december 2012 om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter.

Herudover gælder samme krav for lægemidlers kvalitet som ved fremstilling af magistrelle lægemidler, herunder krav til råvarer, mellemprodukter, lægemiddelformstandarder, kontrol og opbevaring, og der henvises til afsnittene for magistrelle lægemidler i samme bilag. Krav om udarbejdelse af risikovurderinger eller produkt dossier gælder dog ikke for fremstilling af lægemidler til beredskabssituationer.

### *Udløbsforlængelse*

Som det fremgår af afsnittet om opbevaringstid for magistrelle lægemidler, må opbevaringstiden højst fastsættes til 2 år. Lægemedelstyrelsen kan dog på grundlag af resultaterne af udførte holdbarhedsforsøg give tilladelse til en længere opbevaringstid.

Da der er tale om lægemidler, som potentielt skal oplagres i en længere periode til brug for en eventuel beredskabssituation, kan Lægemedelstyrelsen på baggrund af en undersøgelse af lægemidlet og opbevaringsbetingelserne, forlænge lægemidlets udløb som fastsat af fremstilleren. Lægemedlet skal være stabilt og egnet til udløbsforlængelse. Lægemedelstyrelsen vil desuden lægge vægt på, om lægemidlerne har været opbevaret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om distribution af lægemidler.

**Dansk monografi – Cannabisblomst**

Cannabisblomst

Cannabis flos

Dansk monografi med udgangspunkt i

det hollandske OMCs monografi "Cannabis inflorescence" (version 7.1, november 2014).

Alle analyser og grænser beskrevet i monografien skal overholdes ved frigivelse og i hele drogens opbevaringstid. Se endvidere General Notices (Ph. Eur. 10000) og Herbal Drugs (Ph. Eur. 1433) for generelle krav.

**Forkortelsesliste** $\Delta^9$ -THC: Dronabinol ((-)-delta-9-trans- tetrahydrocannabinol) $\Delta^8$ -THC: delta-8-Tetrahydrocannabinol

THCA: (-)-delta-9-trans-Tetrahydrocannabinolsyre

CBD: (-)-trans-Cannabidiol

CBDA: Cannabidiolsyre

CBN: Cannabinol

DLS: Danske Lægemiddelstandarder

NMT: "Not more than"

Ph. Eur. : Den Europæiske Farmakopé

 $\mu$ L: mikroliter

OMC: Dutch Office for Medicinal Cannabis

PDA: fotodiode array

PTFE: Polytetrafluoroethylen ("Teflon")

rpm: omdrejninger per minut

RRT: Relativ retentionstid

RSD: Relativ standardafvigelse

UHPLC: Væskekromatografi med ultrahøj ydeevne

UV: Ultraviolet

V/m: volumen/masse

V/V: volumen/volumen

Prøveforberedelse

**Analyser udført på drogen, som den foreligger:**

Makroskopisk udseende

Mikroskopiske egenskaber

Fremmede bestanddele

**Analyser udført på pulveriseret droge:**

Identifikation ved væskekromatografi (UHPLC-PDA).

Totalaske

Tungmetaller

Tørringstab/ Bestemmelse af vandindhold

Pesticider

Aflatoxiner

Mikrobiel renhed

## Kvantitativ bestemmelse

### Pulverisering af drogen

Pulverisering og sigtning af cannabisblomster kan føre til et betydeligt tab af aktivt materiale, da kirtelhår og resin fra kirtelhår klæber til de anvendte utensilier (f.eks. morter/mølle, knive, sigter m.m.). Pulverisering, til en meget fin størrelse, vil ikke forbedre situationen, tværtimod da kirtelhår og resin fra kirtelhår vil klæbe sig sammen.

Derfor fremstilles cannabispulver i en sigtestørrelse på ca. 5 mm store partikler (dvs. sigte 5600) (Ph. Eur. 2.1.4.). Denne cannabispulverstørrelse bruges i de test, der beskrives i monografien.

## Definition

**Cannabisblomst består af tørrede, hele eller findelte, fuldt udviklede hunlige blomstrende topkud af *Cannabis sativa* L. eller underarter, varieteter eller sorter heraf.**

Hvis der anvendes en underart, varietet eller sort, skal egnetheden af monografien verificeres. Drogen indeholder mindst 90,0 % og højst 110,0 % af det deklarerede indhold af cannabinoider, herunder den fastsatte værdi for henholdsvis  $\Delta^9$ -THC (beregnet som summen af  $\Delta^9$ -THC og THCA) og CBD (beregnet som summen af CBD og CBDA), beregnet af drogens tørvægt (dvs. uden indhold af vand og andre flygtige stoffer).

## KARAKTERER

### Organoleptiske egenskaber

**Farve:** Farven afhænger af varieteten og måden, hvorpå den dyrkes, håndteres, høstes og forarbejdes. Delene fra hunblomsterstanden varierer i farven fra stærk lysegrøn til en dybere mørkegrøn over i mørklilla til lys gul/guld til brun, sommetider med blomster, der har lange rødorange/brunlige grifler og støvfang. Materiale, der er dyrket indendørs, er ofte lysere grøn til stærk lilla i farven, hvorimod materiale, der er dyrket i det fri, oftere har en mørkere grøn til grønbrun til mørklilla farve. Farven bør være ensartet for hver prøve, og der bør ikke være grå eller sorte farver til stede, som er tegn på svampeinfektion. Dele fra blomsterstande med talrige kirtelhår og dækhår kan fremstå mælkehvide og krystallinske.

## IDENTIFIKATION

Drogen identificeres ved dens makroskopiske og mikroskopiske karakteristika og ved væskechromatografi (UHPLC-PDA).

### Makroskopisk udseende

Cannabis råvare leveres oftest som grene og smågrene, der er 1,5 - 5 cm lange eller længere, sommetider i stykker, fra tørrede blomsterstande fra den hunlige plante. Disse dele af blomsterstanden, i daglig tale kaldet "topskud", trimmes oftest med hånden eller maskine, ofte efterladende dele af bladfoden (bladfæstet) og stive bladstilke. Delene har som regel en lysegrøn til mørkegrøn farve, forskellige toner af lilla til mørklilla, eller en grønbrun til brun farve og kan indeholde hele, eller fragmenter fra, reducerede øvre blade, stængler, dæklade, forblade, udviklet bæger, umodent frøanlæg, grifler og kirtelhår eller dækhår. Afstanden mellem leddene i blomsterstanden varierer afhængig af Cannabis varieteten. Mens de korte stængelstykker har en tættere blomsterklase, som får blomsterklaserne til at fremstå mere runde, har de længere stykker en større afstand mellem de individuelle blomster. Cannabis varieteterne varierer med hensyn til de enkelte deles størrelse og hvor fremtrædende de enkelte karakterer er. Morfologiske karakteristika og farveforskelle på cannabisprodukter påvirkes af såvel den botaniske varietet som miljømæssige faktorer, herunder lys, vand, næringsstoffer og måden, hvorpå planten er dyrket, høstet eller bearbejdet. For at udføre en makroskopisk undersøgelse af materiale, som sidder sammen, udblødes

materialet i 70% alkohol for at opløse harpiksen, hvorefter alkoholen hældes fra. Dernæst udblødes i vand. Blade, stængler, dækblade, blomster og frugt kan nu adskilles. Det bemærkes dog, at materiale, der klargøres på denne måde, ikke bør anvendes til kvantitativ analyse på grund af tab af indholdsstoffer.

**Stængler:** Lysebrune, svagt grønne, ujævnt spættede eller helt lilla i farven. Stænglerne på blomsterstanden beskæres ofte lige under leddet. Stænglerne sætter sideskud frit og ofte, men omfanget heraf afhænger af miljømæssige og arvemæssige faktorer samt dyrkningsmetoden. Nodie og internodie er tydelige, med spredte forgreninger, og kan variere i længden. Stænglerne har en fiberrig tekstur, og overfladen er på langs furet med korte stive hår. Bark og ved er tynde, og marven er hvid og porøs. Grenstykker med en større diameter ( $\geq 3$  mm) tages ofte fra endeskud. Materiale med tyndere stængler tages oftest fra blomsterstandens sideskud eller fra sideskud på den øverste blomsterstand.

**Øvre blade:** Findes sjældent på dyrkede planter, da de ofte fjernes ved trimning med maskine eller i hånden. Hvis der er øvre blade på planten, er de lysegrønne til mørkegrønne, sommetider lilla eller lillaspættede i farven, eller brune, tørrede og indskrumpne, og sommetider folder de om blomsterstanden. Efter trimning vil typisk kun den nederste del af bladstilken være efterladt tilbage i form af et stift stykke bladstik ved leddet.

**Dækblade:** Lysegrønne til mørkegrønne eller brungrønne. Talrige, spredte, med smalle fodflige ved basen. Nogle blade er hele andre trekoblede, men i begge tilfælde er de lancetformede og helrandede. Dækblade, der sidder under blomsterklassen er ofte inddelt i 5 linjeformede småblade. Dækblade, der sidder under de enkelte blomster, har ofte 3 meget små småblade. Dækblade og fodflige har en påfaldende tendens til at skrumpe ved tørring, og i nogle tilfælde er det kun dækbladens årer, der forbliver intakte. Under forstørrelse (10 x) kan man se talrige kirtelhår og dækhår.

**Forblade:** Lysegrønne til mørkegrønne eller brungrønne, dannes parvist i dækbladets bladhjørne. Ægformede med but spids og indadbøjede ved basen, således at de omslutter blomsten eller frugten. Under forstørrelse (10 x) kan man se talrige kirtelhår og dækhår.

**Blomster:** Der dannes en enkelt blomst i bladhjørnet på hvert eneste forblad. Bægeret har en lysegrøn til mørkegrøn eller brunlig farve, er dunhåret og folder sig en anelse om frugtknuden eller frugten. Frugtknuden har ét rum med et enkelt krumt frøanlæg og omsluttet af det tynde, behårede bloster. Fra blomsten udgår 2 slanke, lange, dunhårede grifler og støvfang, der spreder sig væk fra hinanden, med en mørk rødbrun til orange farve. Planterne er tvebo. Hanblomsterne har støvdragere, det har hunblomsterne ikke.

**Frugten:** Frugten fra cannabis er en nød og omtales tilsammen med det indkapslede frø ofte som ”frøet”. Medmindre det er bevidst tilsigtet, bør der ikke være frø i korrekt høstet materiale (dvs. Cannabis *sinsemilla*, en cannabisdyrkningsmetode, hvor kun hunblomsterstanden for lov til at blomstre. Uden pollen fra den hanlige plante kan hunblomsten ikke producere frø, hvorved der dannes store tætte blomster). Nødderne adskilles nemt fra de tørrede dele. Nødden er 2-5 mm i diameter og omsluttet af et udvidet/forstørret, vedvarende bloster, omsluttet af et højblad; hver nød er separeret fra andre nødder, en anelse sammenpresset (linseformet) ægformet, skinnende, off-white, grøn, brungrøn, eller gullig-grøn, ofte lillaspættet. Frugtknudens tynde væg/hinde slutter tæt om frøets skal. Frøvæggen er tør og skrøbelig og har et fint net. Endosperm og kimblade er kødfulde. Kimen er buet.

**Trikomer (kirtelhår og dækhår):** Der ses overordnet to slags trikomer: glandulære cannabinoid-producerende trikomer (kirtelhår); og ikke-glandulære ikke-cannabinoid-producerende trikomer (dækhår). Begge kan observeres ved 10-20 x forstørrelse.

**Pulver:** Mat grøn til mørkegrøn, til brun, sommetider lillaagtig. Ved observation af groftmalet materiale ved 20 x forstørrelse, kan man se fragmenter fra nederste epidermis af bladene med bølgede vertikale cellevægge og ovale spalteåbninger (stomata), mens fragmenter fra øverste epidermis har lige cellevægge og ingen spalteåbninger (stomata). Hvis disse karakteristika skal observeres på fintmalet pulver, skal forstørrelsen være højere.

### Mikroskopiske egenskaber


Til mikroskopisk undersøgelse kan blade, dækblade og kviste indlejres i ethanol, vand, eller kloralhydratopløsning.

**Dækblade (brakteer) og blade:** Ved mikroskopisk undersøgelse af blade og dækblade ses en dorsiventral struktur. Palisadevævet består af et enkelt lag (sjældent 2 lag) af cylindriske celler, og det svampede væv af 2-4 lag af afrundede parenkymceller; der er klynger af kalciumoxalatkrystaller i alle dele af mesofyllet. De øverste epidermisceller er besat med encellede, spidse, buede koniske trikomer, der er ca. 150-220 µm lange, med forstørrede baser indeholdende cystolitter af kalciumkarbonat; Nederste epidermis er besat med koniske trikomer, som er længere, ca. 340-500 µm, og slankere, men uden cystolitter. Såvel øverste som nederste epidermis er besat med talrige glandulære trikomer (kirtelhår) og på undersiden er kirtelhårene særligt talrige over midterribben. Der er tre forskellige typer glandulære trikomer (kirtelhår): 1) en lang flercellet stilk og et flercellet hoved med ca. 8 udstrålende kølleformede celler; (2) en kort encellet stilk og et 2-cellet, sjældent 4-cellet, hoved; (3) stilkløse med et flercellet hoved. Under både nederste og øverste epidermis i midterribberegionen ligger nogle få lag af kollenkym. Karstrengen udgøres af sivæv (phloem) bestående af små celler og xylemkar arrangeret i radiære rækker. Nederste epidermis genkendes ved talrige trikomer af 3 typer: ikke-glandulære (dækhår), ikke-glandulære cystolithår og glandulære (kirtelhår). Klynger af kalciumoxalatkrystaller er spredt i grundvævet (grundparenkymet). Cannabis er karakteriseret ved den samtidige tilstedeværelse af cystolithår på cannabisbladenes øvre overflade og ikke-cystolittriske trikomer og stilkøse glandulære trikomer (kirtelhår) på cannabisbladenes nedre overflade.

**Forblade (brakteoler):** Forbladene har et udifferentieret mesofyl med ca. 4 cellelag, hvor det nederste hypodermiske lag har en krystalklynge af kalciumoxalat i næsten alle celler. Den abaksiale overflade er besat med talrige løgformede, glandulære trikomer (kirtelhår) med og uden stilk samt encellede koniske trikomer. Disse trikomer er mest talrige, der hvor forbladet bøjer sig ind for at omslutte frugtknuden eller frugten.

**Blomster:** I griflens epidermis har næsten alle celler en forstørret papil på ca. 90-180 µm med en rundet spids.

**Stængler:** Stænglens epidermis er besat med meget få trikomer, som ligner dem på bladene. Ved et tværsnit af stænglen, kan man se store, uforgrenede mælkerør i sivæv. Der er veludviklede bundter af pericykelfibre på indersiden af sivævet. Både marv og cortex indeholder klynger af kalciumoxalatkrystaller med en diameter på ca. 25-30 µm.



### Billedforklaring

1. Fragment fra højblad (brakteer) med spidse encellede dækkende hår og hår med cystolitter af kalciumkarbonat.
2. Fragment fra epidermis med et knækket cystolithår og tvillingekrystaller af kalciumoxalat.
3. Fire harpiksudskillende hår set forfra: det ene er stadig fuld af harpiks, to er tomme, og det fjerde (ved siden af tallet 3) har stadig kutikula.
4. Fragment fra stilken på et kirtelhår.
5. Tre kirtelhår: to stilkede, et stilkøst: oleo-harpiksen svulmer og udvider kutikula.
6. Fragment fra øvre epidermis på bladstilk med cystolithår.
7. To løsrevne cystolithår: det ene intakt, det andet knækket.
8. Fragment fra nederste epidermis på et blad eller højblad med to dækhår og to nyreformede spalteåbninger (stomata).
9. Fragment fra et frugthøjblad (brakteer) med et dækhår og to kirtelhår på to udviklingsstadier; to tvillingkrystaller af kalciumoxalat i parenkymet; spalteåbning yderst til venstre.
10. Fragment fra nederste epidermis på højblad (brakteer) fra blomsterstanden: tre nyreformede spalteåbninger (stomata), et ungt kirtelhår uden stilk med kutikula (set forfra).
11. To knækkede encellede dækhår; tre små stykker af størknet harpiks.

12. Fragment af stilken på en blomsterstand med to spiralformede kar og et kar med huller; tvillingkrystaller af kalciumoxalat og en gruppe med tre sclerificerede celler. De brudte spiralformede kar til højre ses ofte i præparationerne.
13. Enkeltkrystaller og tvillingekrystaller af kalciumoxalat.
14. Et stilet kirtelhår; kutikula er brudt og har frigivet dets oleo-harpiks.

### **Identifikation ved væskekromatografi (UHPLC-PDA) (Ph. Eur. 2.2.29.)**

ID-bestemmelse ved væskekromatografi (UHPLC) med fotodiode array (PDA) detektor. For at sikre identifikation af relevante indholdsstoffer, skal analyseparametre opnået fra testopløsninger sammenlignes med de tilsvarende analyseparametre opnået fra opløsninger af certificerede referencestandarder. Analysemetode og kromatografiske betingelser er beskrevet under afsnittet Kvantitativ bestemmelse.

I samme analysesekvens køres prøver af testopløsning og relevante referenceopløsninger af hhv.  **$\Delta^9$ -THC, THCA, CBD og CBDA**. Retentionstider med sammenhørende UV spektralprofiler (i intervallet på mindst 220-350 nm), opnået fra analyse af testopløsning, sammenlignes med de tilsvarende sæt af analyseparametre, opnået fra analyse af referenceopløsninger.

Vedrørende retentionstider, så må der højst være en afvigelse på 2 % på retentionstider opnået fra testopløsningen, i forhold til de tilsvarende retentionstider opnået fra referenceopløsninger. Vedrørende UV spektralprofiler, så skal der være en match faktor på mindst 95%. For en mere sikker identifikation af de enkelte toppe, kan testopløsningen med fordel spikes med passende mængder af referencestandarder i samme størrelsesorden, som indholdet af substanserne i testopløsningen.

## **AFPRØVNING**

### **Totalaske (Ph. Eur. 2.4.16.)**

Bestemmes på den pulveriserede droge (ca. 5 mm store partikler dvs. sigte 5600; Ph. Eur. 2.1.4.).

Indholdet skal være maksimalt 20%.

#### **Fremmede bestanddele (Ph. Eur. 2.8.2.)**

Drogen indeholder så vidt muligt ingen fremmede bestanddele såsom olie, støv, snavs og anden forurening med eksempelvis svamp, insekter eller anden animalsk forurening. Der er ingen synlige rådne dele.

Afvej 100 g af den prøve, som skal undersøges, og spred det ud i et tyndt lag. Undersøg om der er fremmedlegemer til stede med det blotte øje eller under en lup (6 x forstørrelse). Skil fremmedlegemerne fra, vej dem, og beregn det procentvise indhold (max. 2%).

For hele blomster gælder desuden: Ingen blade må skyde længere ud end 20 % af blomstens længde. Stilke skæres væk lige under de nederste blomster på blomsterstanden og betragtes som fremmede bestanddele.

For fragmenterede blomster gælder desuden: Højst 2 % af stilkene må være længere end 2,0 cm, og højst 20 % af stilkene må være længere end 1,5 cm.

#### **Tungmetaller (Ph. Eur. 2.4.27.)**

Testen udføres i henhold til Ph. Eur. 2.4.27. med pulveriseret droge (ca. 5 mm store partikler dvs. sigte 5600; Ph. Eur. 2.1.4.) gennem anvendelse af forskellige atomabsorptions- og emissionsteknikker.

Cadmium: højst 1,0 ppm

Bly: højst 5,0 ppm

Kviksølv: højst 0,1 ppm

Herudover kan det være nødvendigt at tilføje test for andre relevante tungmetaller afhængig af den pågældende dyrknings- og fremstillingsmetode, da cannabis kan ophobe tungmetaller gennem bioakkumulation.

**Tørringstab (Ph. Eur. 2.2.32.) / Bestemmelse af vandindhold (Ph. Eur. 2.2.13.)**

Drogen skal opfylde krav om højst 10 % indhold.

Tørringstab (Ph. Eur. 2.2.32.): Bestemmes på 0,500 g af den pulveriserede droge (ca. 5 mm store partikler dvs. sigte 5600; Ph. Eur. 2.1.4.) ved opvarmning i 24 timer ved 40°C over *diphosphorpentoxid R* og vakuum (1,5 – 2,5 kPa).

Bestemmelse af vandindhold (Ph. Eur. 2.2.13.): For droger, der indeholder mere end 10 ml/kg (1 % V/m) æterisk olie (Ph. Eur. 2.8.12 og Essential Oils, Ph. Eur. 2098), kan der udføres en test for vandindhold ved destillation (Ph. Eur. 2.2.13.) i stedet for tørringstabstesten.

**Pesticider (Ph. Eur. 2.8.13.)**

Den pulveriserede droge (ca. 5 mm store partikler dvs. sigte 5600; Ph. Eur. 2.1.4.) skal opfylde kravene i Ph. Eur. 2.8.13. for pesticider.

**Aflatoxiner (Ph. Eur. 2.8.18.)**

Test for aflatoxiner udføres i henhold til Ph. Eur. "Determination of aflatoxins B<sub>1</sub> in herbal drugs (2.8.18.)". Drogen må ikke indeholde mere end 2 µg/kg aflatoxin B<sub>1</sub>.

**Mikrobiel renhed (Ph. Eur. 5.1.8. eller Ph. Eur. 5.1.4)**

Test for mikrobiel renhed for drogen skal overholde kravene i Ph. Eur. 5.1.8 eller Ph. Eur. 5.1.4 afhængig af yderligere drogetilberedning og administrationsvej.

**KVANTITATIV BESTEMMELSE****Cannabinoider**

Væskekromatografi (UHPLC) (Ph. Eur. 2.2.29.).

*Testopløsning 1:*

1,000 g af den pulveriserede droge (ca. 5 mm store partikler dvs. sigte 5600; Ph. Eur. 2.1.4.) omrystes (ca. 300 rpm) i 15 minutter med 40 mL ethanol R og centrifugeres herefter (3000 rpm). Den klare supernatant overføres til en 100mL målekolbe. Droge-resten ekstraheres yderligere to gange med 25 mL ethanol R. Supernatanterne samles og der fyldes op til 100 mL med ethanol R. Opløsningen filtreres derefter gennem et passende filter, f.eks. af papir, og filtreres igen gennem et PTFE-membranfilter med en porestørrelse på ≤ 0,45 µm.

*Testopløsning 2:*

10 x fortynding af Testopløsning 1 med solvent, eksempelvis 1,0 mL til 10 mL

*Testopløsning 3:*

10 x fortynding af Testopløsning 2 med solvent, eksempelvis 1,0 mL til 10 mL, hvilket svarer til en 100 x fortynding af Testopløsning 1.

*Δ<sup>9</sup>-THC, Δ<sup>8</sup>-THC, CBD og CBN beregnes ud fra testopløsning 2.*

THCA og CBDA beregnes ud fra testopløsning 3.

Solvent: Blanding af 3 volumen mobilfase A og 7 volumen mobilfase B (se nedenfor under *eluering*).

*Referenceopløsninger:*

- 1) Δ<sup>9</sup>-THC (1 mg/mL i methanol)
- 2) THCA (1 mg/mL i methanol)
- 3) CBD (1 mg/mL i methanol)
- 4) CBDA (1 mg/mL i methanol eller acetonitril)

5) CBN (1 mg/mL i methanol)

6)  $\Delta^8$ -THC (1 mg/mL i methanol)

7) Resolutionsopløsning  $\Delta^9$ -THC/  $\Delta^8$ -THC

Resolutionsopløsning fremstilles af  $\Delta^9$ -THC og  $\Delta^8$ -THC med en koncentration på hhv. 0,04 mg/ml og 0,0025 mg/ml. Opløsningen kan for eksempel fremstilles ved at blande 400  $\mu$ L referenceopløsning 1) og 25  $\mu$ L referenceopløsning 6) i en 10 ml målekolbe. Omryste blandingen med 4 ml solvent og derefter fylde op til mærket med *solvent*.

*Kalibreringskurver:* Bestemmes for hhv.  $\Delta^9$ -THC, THCA, CBD, CBDA, CBN og  $\Delta^8$ -THC ud fra mindst 6 koncentrationer i intervallet 50-150% fra det enkelte stofs deklarerede eller forventede indhold fortyndet med solvent (se ovenfor).

*Kromatografisk system: UHPLC-system.*

*Kolonne:*

-dimensioner:  $\varnothing = 2,1$  mm;  $l = 150$  mm

-stationær fase: C18 (1,7  $\mu$ m) (Valideringen af den kvantitative bestemmelse er udført med kolonnetypen Acquity fra Waters), rustfrit stål.

*Kolonnetemperatur: 30°C*

*Eluering:*

Mobil fase A: opløsning af 0,1 % myresyre i vandR

Mobil fase B: opløsning af 0,1 % myresyre i acetonitrilR

Flow: 0,4 mL/min

*Gradient:*

| Tid (min.)  | Mobilfase A<br>(% V/V) | Mobilfase B<br>(% V/V) |
|-------------|------------------------|------------------------|
| 0 – 6       | 30                     | 70                     |
| 6 – 10,5    | 30 $\rightarrow$ 0     | 70 $\rightarrow$ 100   |
| 10,5 – 10,7 | 0                      | 100                    |

*Detektor:* UV-detektor, 228 nm.

*Injektor:* auto-injektor ved 8°C

*Injektionsvolumen:* 10  $\mu$ L

| Substans        | Relativ retentionstid, (ca.): |
|-----------------|-------------------------------|
| CBDA            | 0,48                          |
| CBD             | 0,57                          |
| CBN             | 0,88                          |
| $\Delta^9$ -THC | 1,00                          |
| $\Delta^8$ -THC | 1,02                          |

|      |      |
|------|------|
| THCA | 1,12 |
|------|------|

*Egnethedstest af systemet (Chromatographic separation techniques (Ph. Eur. 2.2.46)):*

Resolution:

Resolutionen mellem toppene for  $\Delta^8$ -THC og  $\Delta^9$ -THC i resolutionsblandingen bør være  $\geq 1,2$ .

Præcision (Repeterbarhed):

THCA-referenceopløsningen i en koncentration på 0,025 mg/ml injiceres 6 gange, og der tages et gennemsnit af arealerne. Den relative standardafvigelse (RSD%) bør være  $\leq 2,0$  %.

*Beregning*

Det procentvise indhold af hhv.  $\Delta^9$ -THC, CBD, CBN og  $\Delta^8$ -THC beregnes ud fra **testopløsning 2** og ved brug af kalibreringskurve for de respektive referencestandarder.

$$\% \text{ indhold} = \frac{K \times R \times F}{v \times (100 - D)}$$

K = Koncentration af hhv.  $\Delta^9$ -THC/ CBD/ CBN/  $\Delta^8$ -THC i **testopløsning 2** som beregnes ved anvendelse af kalibreringskurven for de respektive referencestandarder [mg/ml]

R = Renhed af den respektive referencestandard [%]

F = 100 (faktor)

v = Vægt af den pulveriserede droge i **testopløsning 1** i gram (1,000 g)

D= Drogens tørringstab [%]

Det procentvise indhold af hhv. **THCA og CBDA** beregnes ud fra **testopløsning 3** og ved brug af kalibreringskurve for de respektive referencestandarder.

$$\% \text{ indhold} = \frac{K \times R \times F}{v \times (100 - D)}$$

K = Koncentration af hhv. THCA/CBDA i **testopløsning 3**, som beregnes ved anvendelse af kalibreringskurven for de respektive reference-standarder [mg/ml]

R = Renhed af den respektive referencestandard [%]

F = 1000 (faktor)

v = Vægt af den pulveriserede droge i **testopløsning 1** i gram (1,000 g)

D= Drogens tørringstab [%]

Afhængig af prøvernes mængde af indholdsstoffer, kan det i visse tilfælde være relevant at benytte **testopløsning 2** i stedet for **testopløsning 3** – eller omvendt - til kvantificeringen. Afhængig af, hvilken testopløsning der benyttes til kvantificeringen, skal der benyttes den, til den aktuelle testopløsning (fortynding af testopløsning 1), korrekte formel til beregning af % indholdet.

*Beregning af det totale indhold af  $\Delta^9$ -THC og CBD i procent:*

Den totale sum af THC-ækvivalenter, beregnet som  $\Delta^9$ -THC.

$$\text{Total THC i \%} = \Delta^9\text{-THC} + (0,877 \times \text{THCA})$$

Den totale sum af CBD-ækvivalenter, beregnet som CBD

$$\text{Total CBD i \%} = \text{CBD} + (0,877 \times \text{CBDA})$$

Omregningsfaktor på 0,877 anvendes til omregning af det faktisk målte indhold af THCA (MW: 358,5 g/mol) og CBDA (MW: 358,5 g/mol) til de beregnede ækvivalente værdier for  $\Delta^9$ -THC (MW: 314,5 g/mol) og CBD (MW: 314,5 g/mol).



Grænser:




-CBN: maksimum 1,0 % (beregnet af drogens tørvægt)


-Rapporteringsgrænse: Koncentrationer under 0,05 %, skal angives som ”NMT 0,05%” (beregnet for hver enkelt substans).

Tests for andre eventuelle relevante indholdsstoffer og urenheder skal fremgå af specifikationen.

*Strukturformler for cannabinoider*

|                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta^9$ -THC: Dronabinol ((-)-delta-9-trans-Tetrahydrocannabinol) |  <p style="text-align: center;">C<sub>21</sub>H<sub>30</sub>O<sub>2</sub>      M<sub>r</sub> 314.46</p>   |
| $\Delta^8$ -THC: delta-8-Tetrahydrocannabinol                        |  <p style="text-align: center;">C<sub>22</sub>H<sub>30</sub>O<sub>4</sub>      M<sub>r</sub> 358.47</p> |

|                                                          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>THCA: (-)-delta-9-trans-Tetrahydro-cannabinolsyre</p> |  <p><math>C_{22}H_{30}O_4</math> <math>M_r</math> 358.47</p>   |
| <p>CBD: (-)-trans-Cannabidiol</p>                        |  <p><math>C_{21}H_{30}O_2</math> <math>M_r</math> 314.46</p>  |
| <p>CBDA: Cannabidiolsyre</p>                             |  <p><math>C_{22}H_{30}O_4</math> <math>M_r</math> 358.47</p> |

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBN: Cannabinol | <br>$C_{21}H_{26}O_2$ $M_r$ 310.43 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OPBEVARING

Beskyttet mod lys og fugt i lufttæt emballage. Den harpiks, som cannabis udskiller, kan adsorberes af bestemte overflader og kan trænge ind i og igennem plastik.

## Produktformer for medicinsk cannabis

Supplerende produktformer, der accepteres for produkter indeholdende medicinsk cannabis. Desuden kan accepterede standardtermer for ordinære lægemidler angivet i DLS anvendes.

| Dansk                          | Engelsk                                   | DLS    |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Urtete/ inhalationsdamp, droge | Herbal tea/inhalation vapour, herbal drug | 2019.0 |
| Inhalationsdamp, droge         | Inhalation vapour, herbal drug            | 2019.0 |

«